

Revue Critique

02-12-1912

Les albumines toxiques.

Archives générales de médecine - 1890. II. p. 341

Depuis les études de Eamber e Lémi (1877-72) de Donchet e Eamber (1880) pensou-se q as albuminas n° tornavam-se tóxicas depois de sofrer recomposição, p°r proteínas produzidas com o corpo em decomposição (Albuminose, Albuminose) porciat, estudos mais recentes mostram p°r que as albuminas mte mais próximas das albuminas são as mesmas tóxicas. Começou-se por verificar se o organismo produz substâncias albuminoides tóxicas como demonstraram Rumino e Bordoni (Riforma medica 1889 n° 251-252) p°r o soro sanguíneo de certos animais, perficiando p°r injeção de a um animal vertebrado (carniça, cão, gato, coelho, galinha, tartaruga, etc) o soro sanguíneo d'um animal da mesma espécie ou de espécie diversa (homem). Observava-se um certo numero de symptomos tóxicos, variáveis segund a quantidade e origem de líquido empregado. — Outras origens de albuminas tóxicas foram descobertas: a cellula microbiana por uma vez secreta albuminas dotadas de p°r poder tóxico Brieger e Frankel (Berlin klinisch. Wochenschr. n. 11 e 12 1890) isolaram de bac. da diphteria uma substância q por sua composição antezimal é mte semelhante das albuminas e q é extremamente tóxica. Haselberg e Leukin (Brit. med. Journal. 1889. p. 810). já

Embrun obitudo das culturas de bac. de carbon.
 este uma "albuminose" ontologica e Christmas
 (chim. Inst. Pasteur (1888 p. 477)) encontram nos
 culturas de *Staphylococcus aureus* uma matéria
 albuminosa capaz de provocar a supuração.
 Os ^{vegetar} animais superiores vem a encontrar-se
 com albuminas tóxicas. Kellner e Stillmark
 usaram dos grãos de ricina um albuminoid
 tóxico