


Notas

Caderno n.º 2

1904.



1001

Jan 5

1901

1901

Janeiro -

- Dia 1 -

Serie E (Haff. alt.)

Col. n.º 4. 792 gr. 39.3

Serie F (Haff. alt.)

Col. n.º 1 544 38.9

" 2 576 38.4

Serie I (Termin.)

Col. n.º 2 415 gr. 39.1

Col. tuberc.

470 gr

- 2 de Janeiro -

Foi enviada uma garrafa com
 Células de Bordenau cult. de peste de Santa -

Foi inoculada e cur. 2 com 4cc
 de emulsão de peste viva -

Foi sangrada e cor. n.º 8 na j.

1001

gula do lado esquerdo, tendo se
feito uma tuberculosa infrastifosa
- axion - presença de lado direito
Foram retirados cerca de 2 litros de
sangue - oil -

Série E (H. all)

Col. n. 4 - 750 - 39.3

Série F (H. all)

Col. n. 1 - 524 - 39.1

Col. n. 2 - 565 - 38.8

Série I (Tern)

N. 2 - 357 - 38.

Col. tubere.

435.

Foram preparados caldos (agor em
sarrafo) -

3 de Janeiro

S. E (H. all) - 45735 - 38.7

S. F (H. all) 1-525-38.6 - 2-576-38.6

S. I (Tern) 2-365-38.4 - Col. tubere. 437

3

No mesmo concha foi encontrado
um animal doente com a seguinte
sympptomatologia -

Conjuntiva dupla - Endoto dupladas
O corpo coberto de orlha e flocos, e
se de de numerosas tumefacções formam
papulos elevados, nos pedos da patla
existem tumefacções E emergindo a
unha de mais uma orlha e presa
da pele de tumefacção - S. de pyria -
Foram semeados mais de cultivos
e feitos preparações: 1.º com o sangue
colhido numa vein da orlha
2.º com o conteúdo dos papulos -
As preparações foram curadas com
Mercurio phenicada e o sangue pelo
aul de metylen e coma -

A. de J. J. J.

S.E. (Hall) 4. 770. 39

S.F. (Hall) = 1 = 532. 38.8 2 = 582. 38.7

S.I. (Tom) = 2 = 375. 39.2 Cub. 445

Foi injectado às 12:30 o canalis
n° 5 com 2cc d'uma emulsão de
pólv. viva f. l. b. H. 0. 0. 0. - A injeção
foi feita na pupila esquerda.

À 1:30 foi puncionada a pupila
direita e obtido 2cc de sangue com
o qual foi feito um emulsão com
tubo de vidro glicerinado, foi feita uma
preparação microscópica e injectado
com 0.5cc a cabeça direita, na pupila.

96 Cab. 1. Trichina na cabeça - 224 gr 38.9

Pelto liso, branco, amarello e pálido
Injectado a 1:30 na pupila com 0.5cc de
sangue -

Às 3h. de tarde foi feita nova
colheita de sangue (Vaccinella) com o

qual foi anexado um tubo de vidro
feito preparações microscópicas e
injectado com 0.5cc de sangue a
Cab. n° 2. Trichina na cabeça - 224 gr
38.8. Amarella semelh. branca com manchas
amarellas -

97. Foi recolhido asepticamente
o soro do sangue da cabeça 1 sangue
a 2-1-01 - O sangue tinha sido
recolhido num crystallizador com
tubo de vidro. O soro obtido apresen-
tava a turvação recente e os contami-
nados (e poder-se-ia ter duvida por conta
do sangue, porquanto e tricarbo tem
m. probabilidades de se contaminar). O
soro recolhido num balão foi colli-
na estufa a 35° -

— Os meios de cultura em sangue
com material colhido no edro
doeste (3) apresentaram o seguinte:
3 tubos semeados com o conteúdo

dos papulos estavam coloridos. Tubo
de culho amarello com sangue
apresentando-se lúmen.

As preparações microscópicas não
revelaram grande p^{ta} com os papulos
e mostraram a existência d'um
pequeno bacillo, muito fútil em o
sangue (Essas observações carecem de
mais cuidadoso exame).

O calthi morreu a 3^{ta} manhã.
Foi feita autópsia a 3^{ta} do dia.
Não havia lesões visíveis.

Enorme edema dos lobos. Infútil
que examinamos as mícel dos papulos
que não obtinham os fônos nosas.
Das asphyxias de pulmão (congestão
e ecchymoses sub-pleurais). Foram
recolhidos e fixados em sublimado
nêo as ref^{tes} peles: papulos reunidos
ao mícel do labro e narinas,
bexiga, bazo, fígado, rim.

Foi recolhida a urina.

Foram feitas culturas com
palpa de bazo (em caldo).

Sempe de coração (em caldo).

Com o sangue do coração foi
inoculado sob a pelle um
calthi (4) -

Foram feitas preparações microscópicas
com o sangue de coração.

O pinto (1) inoculado por
via endêmica com o cooco isolado
da bexiga d'um pinto a 18-XII-00
não apresenta no ponto de inoculação.

3 de Janeiro

O calthi inoculado não apresentou
as culturas p^{ta} com o sangue de
calthi 3 soro e staphylococci
branco -

Nas preparações feitas com o sangue
de calthi nota-se intensa phagocytose.

dos dados postas

Line E (Haff all)

4 = 806 - 38.6

S.F. (Haff) 1-573-38.8. 2 605-38.8

S.I. (Tern) 2 384-38.1. Cob. tub. 476,

Coches n. 4 - 2069-39.4.

6 de Janeiro

S.E. (Haff) 4 806 - 39.

S.F. (Haff) 1-565-39.2. 2-614-39.1

S.I. (Tern) 2 395-39. Cob. tub. 1184.

Coches 4 - 2085-39.5.

As cebéias injetadas com o
sampo de corallo 5 mds. apresentando
assim como as culturas

Foi injetada a cultura n. 3

7 de Janeiro

S.E. (Haff) 4 814 - 38.9

S.F. (Haff) 1-602-38.2-649-39

S.I. (Tern) 2 405-38.6. Cob. tub. 512

Coches 3 - 2054 - 39.9

A cultura feita com o sampo de
via de calhe 3 a 3-1-01. A cultura
em água f. com a cult. acima em
5-1-01. A cultura feita com o
sampo de corallo do calhe 3 a
4-1-01 deram todas um
Coccus, e parece ser o *Staphylococcus*
e branco (?).

8 de Janeiro

S.E. (Haff) 4 - 830 - 39.5.

S.F. (Haff) 1-615-39.4. 2-659-39.5

S.I. (Tern) 2 - 417-39.2. Cob. tub. 517

Coches 4 - 2010 - 39.6.

Proccorum mais 3 cochos de
vinho apresentando todos os
sintomas de calhe n. 3. Foi
retirado asepticamente da sera
da cultura cerca de 1 cc de sampo
com que foi sensado um tubo
de calhe e com o qual foram

feitos preparados. Essas revelam
a ausência de pedúnculo microrr.
O outro celho dante
apresentavam apenas conjunção

9 de Janeiro.

S.E. (Haff. all) $\frac{4}{190} = 39.3$

S.F. (Haff.) $\frac{1}{590} = 39.1$ $\frac{2}{635} = 39.0$

SI (Tem) $\frac{2}{430} = 39.4$. Cal. Feb. 507.

Celha 4. 202. 39.8

Foi injectada o corallo 2 com
Sec. de embrião de peste a 1.16 na
esterilizada. A operação foi feita às
11^h 45 m. Às 12^h 15 ficou retida
asépticamente ranço da via com
o qual foram feitas preparações,
sendo então injectada no
peritônio e no 2^o celho.

Cal. - Fuchina na cabeça 250 fr.

39.3. Dello lio, preto com mancha
branca circunscrita em a. puta

98

que abraça a orelha e oche direito

O Soro de car. 8. estava com
minado. não obstante foi
ensaiado sendo injectado na
dose de 0^o 2 e 0^o 4 as col. 3^{as}.

Cal. 1. Fuchina no tronco. 246 fr.

39^o. Dello lio. Preto. Bronca lio e
focinho até o pescoço; mancha mancha
salva e oche direito. Depoisa mancha
preta salva e oche direito e contra

em cima da orelha esquerda; mancha
branca no tronco e preto em torn.

dos órgãos genitais. Injectada sob
a pelle do abdômen e em partes
diferentes com 0^o 2 de soro de
car. 8. e 0^o 2 de embrião a
1.16 de m. e m. e m. de 48 h.

Cal. 2. Fuchina na cabeça 254 fr.

39^o 2. Dello lio. Branca e preto.

Branca em todo lado exceto a região
de focinho e orelhas. Preto na lateral

99

100

direito a excepção de peçoço
 5 e bratos. Mancha preto olea
 de amarello em torno de olhos
 direito Linha branca indo de
 peçoço ao focinho passando sobre
 as orelhas e olhos. Injetada
 em pontos diferentes de abdômen
 com $0^{\circ} 4$ de soro de cor S e
 $0^{\circ} 2$ da emulsão de feto a 1:16 de 44h
 Cub. 3. Testempha - Temp. $39^{\circ} 5$
 Dzo 204. Testempha e bratan
 Injetadas com $0^{\circ} 2$ de emulsão
 de feto a 1:16 de 44h a pelle do abdômen

Todas essas inoculações foram feitas
 das 2^{as} às 2^{as} 20 da tarde -

Foram corados preparações
 feitas com o producto da
 punção de bazo e não feitas
 no periodo de calcificação (filos
 interm. frota di ana). As preparações
 foram coradas pela tharminna

101.

phonicada por ser muito bem
 controlada. Os lados de fórm
 esphéricas natam e fórm
 em margens de muito caract
 risticos -

10 de Janeiro -

S.E. (Hall) 4 772 39.7

S.F. (Hall) 1 569 39.3 = 2 629 39.1

Cub. Tuberc. 507 S.I. (Tem) 2 434 39.1

Calc. 4 39.8

A calcia 5 S.E. (Hall) injetada
 com feto as 2^{as} 10 de 29 XII os apresenta
 no ponto de inoculação um tuberc
 que suppurava. A testempha apre
 ta 1^a com tuberc. porém não suppu
 rado -

11 de Janeiro -

S.E. (Hall) 4 754 38.9

S.F. (Hall) 1 561 39. = 2 625 39.2

S.I. (Tem) 2 439 39.5 - Cub. Tub. 527

Calc. 4 2039 39.6

A cabana injectada ne peribronchi
14-1-01. morrem dos 9^{as} 2^{as} m
foi retirado e examinado peribronchi
com e qual foram feitos cultivos
em caldo e preparações
mostraram a existência de
microbios característicos da peste

JAN 16 1901

16 de Janeiro

S.E. 4. 762 p. 38.5

S.F. 1. 554 p. 38.4. 2. 602 p. 38.7

I. 2. 430 p. 38.9. Cob. tub. 502 p.

O culho injectado a 4-1-01

(culho n. 4) foi comitente de sae
nada tendo apresentado consecuti-
vamente a injeccao.

Foi injectado -

17 de Janeiro

S.E. 4. 187. 39.

S.F. 1. 532. 38.7. 2. 615. 38.6

S.I. 2. 440. 39.3. Cob. tub. 515.

Morreu a cabana injectada incul-
neamente com peste e soro (0.4) no
dia 9-1-01 (Cab. n. 102). Foi feita
autopsia e preparações sendo confirmada
a diagnose da peste.

JAN 18 1901

18 de Janeiro

S.E. 4. 737. 38.9

S.F. 1. 580. 38.7. 2. 607. 38.7

S.I. 2. 432. 39.1. Cob. tub. 524

Foi injectado o cor n. 2 com
15cc. de emulsaõ viva de peste a 1.16
e aguçam foi feita a 1.45. A
2^{as} 15 da tarde foram retiradas do
vira 10cc de sangue com 8cc de
puro foi inoculada no peribronchi
a v. cabana -

102

Cab. 102 - Trachea ne trogiro. Bronchi
e pta. Mancha amarella no alve e
culho e pta. Mancha amarella no pta.
no trogiro. Do 198 p. Temp 39.4

Soc de cult de pte vta -
 - O son do corpo de
 cor. 1. apresentava-se muito
 devido a contaminação na
 a pte atorn o mma pessoa
 pdeu de crystallisado. Foi
 transvasado e esterilizado
 por aquecimento descontínuo
 a cultura pecton com o
 material recolhido na cultura
 morta da quineta remanente
 a 19-1-01 apresentaram o res^{to};
 sangue de coraçao - nada
 quando peritonal - cultura -

JAN 22 1901

— S. E. (Hall) 4. 770 gr. 38.8.
 S. F. 1 620. 39. 2 637. 39.2
 S. I. 2 422. 39.4
 Cal. tub. 1. 507. 2 (m) 39.0

Jan. 23. 1901

— S. E. = 4. 760. 38.8

S. F. = 1 610. 39.1 2 630. 38.5
 S. I. = 2 437. 38.7.
 Cal. tub. 1. 507. 2 39.5.

24 Jan. 1901

S. E. (Hall) 4 770 gr. 38.7.
 S. F. (Hall) 1 565. 38.7. 2 567. 38.2.
 S. I. (Tern) 2 444. 38.7
 Cal. tub. 534.

25 de Jan. 1901

S. E. (Hall) 4 803. 38.6
 S. F. (Hall) 1. 655 gr. 38.8. 2 630. 39.1
 Cal. tub. 577.

26 de Jan. 1901

S. E. (Hall) 4. 810. 39.
 S. F. (Hall) 1. 668. 38.8. 2 650. 39.
 S. I. (Tern) 2 - 39.
 Cal. tub. 1. 570. 2 (m) 420.

27 de Janeiro

S. E. (Hall) 4. 785. 39.
 S. F. (Hall) 1. 660. 38.7. 2 647. 38.8.
 S. I. 2 457. 39.3.
 Cal. tub. 1. 602.

28 de Janeiro

S.E. (Hall.) 4 747 gr. 38.6
 S.F. (Hall.) 1 615-388. 2 627. 38.5
 S.I.V. 2 440 gr. 39.3
 Cob. Int. 1- 525 gr.

— Foi injectado o cor. S. com léc.
 de emulsão de peste suína —
 — Morreu a cob. 101. Testemunha
 inoculada a 9 de Jan. com pte (6.2)
 (o bac. da peste está m^{te} atenuado
 matando esse animal em 19 dias) — Foi
 pte. anterior —

— Foram injectados no peritônio
 com 2cc. de alco. de fixação de
 bacilho esterilizado e refrigerado.

103

Cob. 1 - Fuchsin na cabeça - 222 gr.
 1. 38.9 - Pellos lisos: pretos e amarelos.
 Pte.: fronte, costas, traseiro amarelo;
 cabeça pouco plana, e abdome.

104

Cob. 2 - Fuchsin no traseiro - 230 gr.
 39.3. Pellos lisos - brancos amarelos e pretos.
 Branca na face inferior acima e abaixo

de olhos direitos e no traseiro, abrangendo
 as pernas, amarela no processo, no lado
 esquerdo e ao redor do olho - pte.
 em 1^a parte de cada direito

105

Cob. 3 - Violeta na cabeça - 195 gr.
 39.4. Pellos lisos, branca com manchas
 pretas ao redor do olho esquerdo e
 no quarto direito, compreendendo o
 coxa de mesmo lado —

Foi inoculada com alguma gota
 de emulsão de peste a 1.16 no
 peritônio, uma cápsula já
 tinha sido injectada com
 sangue e um curallo - da via
 suína de 1 mes —

29 de Janeiro

S.E. (Hall.) 4 - 815 gr. 38.5 -
 S.F. (Hall.) 1 710 gr. 38.7 - 2 680 39°
 S.I.V. 2 452. 39.4 -
 Cob. Int. 1- 590 -

30 de Janeiro. S.E. (4) 805. 38.6

S.F. 1 712. 38.7 - 2 670. 38.9

S.I. 2 452. 39.0

Calc. tub. 1 587

31 de Janeiro. S.E. 4 822. 38.8

S.F. 1 742. 39.0 - 2 677. 38.9

S.I. 2 460. 39.3

Calc. tub. 602

Calc. misc. com oleo: 1 210. 38.8 - 2 220.

38.5. 3 195. 38.3

1 de Fevereiro. S.E. (H. all) 4 - 780. 38.6

S.F. (H. all) 1 685. 38.5 - 2 645. 38.7

S.I. (Term) 2 460. 38.8

Calc. tub. 5738

Calc. misc. com oleo: 1. 200. 38.4 -

2 = 208. 38.3 - 3 183. 38.5

Foi inoculada na pelle do
abdomen com um pouco de

106

bercelos: num cabine de 243 gr.
e 39.1

Foi injectado o corallo 4 com
uma emulsaõ a 1.16 de cultura
de 72 horas e coade nua mais
atraves de flange e linhu mas
sem de gaso com de credito
grande foram injectado 9cc e
cossalto comeca a apresentar
sympthomas alarmantes sendo en-
taõ suspensa a apreguõ

2 de Fevereiro. S.E. (H. all) 4. 502. 38.5

S.F. (H. all) 1 730. 38.7 - 2 652. 38.5

S.I. (T) 2 468 gr. 39.

Calc. misc. H. hf. 1 210. 38.5 - 2 = 212. 38.4

3 190. 38.4

Calc. tub. A. 634 - B = 249

3 de Fevereiro. S.E. (H. all) 4 776. 38.

S.F. (H. all) 1 708. 38.2 - 2 626. 38.3

S.I. (Tr.) 464. 38.9

Cab. imp. com d. 1 200. 38.2 - 2 207. 38.5

3 182. 38.3

Cab. tub. A 577r. B. 243.

4 de Fevereiro S.E. 4 765r. 38.7.

S.F. 1 712. 38.9. 2 637. 39.

S.I. 2 466

Cab. tub. A 560 B. 245

Cab. in com d. 1 200. 38.5. 2 207. 38.6. 3 184. 38.7.

5 de Fevereiro S.E. (H. all) 4. 815. 38.6

S.F. 1. 747. 38.7. 2 632. 39.

S.I. 2 470. 39.1

Cab. tub. A 607. B. 257.

Cab. nob. 1 212. 38.5. 2. 207. 38.8.

3 187. 38.7.

A cobrã B (tub.) inoculada a
1 com carne tuberculosa fresca.um cancro característico no
ponte de inoculação -For. sangue e car. 2, sendo
retornado 2 litros de sangue.Um em virtude d'um acidente
(na adaptação da pga inter-
mediária ac parvitar da cultura
de Kocert.) entrou mte. e, sendo
se não contaminado e sangue -- Foram semeados 3 porções
de parte dos pass. numa cultura
agar. pte com caldo Martin -

6 de Fevereiro S.E. (H. all) 4. 845. 39.0

S.F. 1. 775. 39.0. 2 647. 39.2

S.I. 2 465. 39.2

Cab. tub. A 022. B 270r.

Cab. inocul. com d. i.

1 - 222 - 38.7.

2 - 215 - 38.6

3 - 197 - 38.8

4' 31. t. murem a cob. inoculada
a 28-1-01 com peste no peritomeu
A antopia foi ^{ta} espicamente
ocultando-se por processo de
porde muscular e expando
ventrosas com a qual foi corado
um tubo de calder glicerinado
Na cavidade abdominal encontra-
se um apêndice transverso com
agua de coque. No epiploon
e no mesenterio encontram-se
nódulos espessos formados
pelo acúmulo de de pequenos
tuberculos. (Com essas produções
foram ^{fl.} *fructus*) é uma *Edulis*
foi fixada no sub. a oide *fructu*
culo de mesenterio. No *figado*
e baze havia fl. *alguna* que
mulacões. — O *tubo* fo
ocultado espicamente e
a turede com arica, modo

2meado em agar glicerinado.
Foi também feita uma preparação
com a *Epith. peritomeu*.
— O *capitulo* de sempre
de car. 2 e por bem e a
atravessado de cralho em completo
no fim de 24h., na seleção.
Foi feita e transvasamente
uma preparação de Fernbach de
^{te} *ref. moti*: a uma jarrafa
foi adaptada uma rolha de
borracha bi. perfurada. Os
orifícios um era atravessado
por um tubo encurvado me
ia até o fundo da jarrafa, e
o extremidade livre era adaptada
no meio d um longo tubo de
borracha a um *recart* de
vidro terminando *repass* e firme
junto. O *antop.* orifício era *aberto*
por um tubo *carro* *movido* d uma

Epith. peritomeu
"isolado"

rolha de algatim - *Arctia*

Patavereiro - S. E. (Hall) 4 = 800p. 38.8
S. F. - 1 = 750p. 38.9 2 627. 38.5
S. I. 2 = 470p. 38.8

Col. tub. A 595 - B - 250

Col. inv. com elev.: 1 = 212. 38.7

2 = 202. 38.5 3 = 182. 38.9

— Foi maculado e cor. 8
com 16cc de amido de pó de
vira —

— Foi distribuído em peças
de 10cc o 1.º cor. 80 cor. 2. 4
peças foram esterilizadas tendo
no fundo algumas gotas de
cublimado a 1:1000 e depois
de arrolhadas aspticamente
foram mergulhadas no an-
colimado até o fechamento he-
mético pela orla eixos / mofofi-
sando então collocando na estufa

a 37° — A garrafa de *Arctia*
p. ante tinha sido trançada
e cor. ante de esterilizada
foi lavada com cublimado —

S. de Taverneiro - S. E. (Hall) 4. 835 - 38.8

S. F. 1 = 795. 39° - 2 635 - 39.2

S. I. 2 = 490 - 39.3

Col. inv. com elev.: 1. 245 - 38.8

2. 232 - 38.9

3. 212 - 38.7

Col. tub. A 682 - B - 280

— Foram retirados 4 litros
de sangue do casale nº 2 —

— Foi ensaiado o cor. 8
cor. 2. onde injectados aban-
com misturas de 0.4 de
cultura de pó de 4 horas e
de dois de cor. de: 0.2; 0.6 e 1.º

As colônias injectadas foram as segs:

107

Col. 1. Fuchsin na cabeça.
289p. 39°.3. Pellos lisos.
Lado esquerdo e fronte branco
mancha preta ao redor e
p^{te} tr^z das orelhas. Mancha
amarella na metade anterior
e preta na posterior de cada
direito. Dalgata mancha
amarella no tronco, estendi-
do as axilas. Injectada
entre 3^h e 3^h 30' da tarde com
uma mistura de 0°.2 soro
e 0°.4 de cult. de peste em caldo

108

Col. 2. Fuchsin no tórax.
294p. 39°.5. Pellos lisos. Branco
com mancha preta transversal
desde as costas até a p^{te}
anterior esquerda, mancha

amarella, circunscorrendo a
orelha esquerda, mancha preta
ao redor do olho direito e
amarella sobre a orelha direita.
Injectada entre as 3^h e 3^h 30' da
tarde com uma mistura de
0°.6 de soro e 0°.4 de
cult. de peste em caldo de 4 dias

109

Col. 3. Violeta na cabeça. 254p.
39°.8. Pellos lisos. Preta com
mancha amarella escura no
terço anterior de cada direito, pro-
longando-se um pouco para as
costas e para a p^{te} anterior
direita. Injectada entre
3^h e 3^h 30' com uma mistura
de 1cc. de soro e 0°.4 de
cultura de peste.

110

Col. 4. Violeta no tórax. 355p. 39°.5

Pellos conspurados - Branca
 Mocho amarella ar redor do
 olho esquerdo e sobre o olho
 direito. Injetada entre
 3^a e 3.30 t. com 0^{ca} 4 de cultura
 de peste - Testemunha.

9 de Fevereiro P.E (Hall) 4 - 782 - 38.6
 P.I (H.) 1 747r. 38.9 - 2 622 - 38.4
 P.I 2 440 - 39.5 -
 Cob. lio. A 620 - B 247
 Cob. a des - 1 230 - 38.8 - 2 217 - 38.8
 3 - 197 - 39.3.

As culturas feitas com
 base da cabia a 6-2-01
 apontaram a pureza onde
 com elles remeado tubo de
 agar de caldo glycinado.
 A pur. fta com a exm. de
 penitencia. mortuaria e a
 ausencia de microbio e J

for confirmado pelo culturas
 As preparações fta com a morte
 de tuberculo de epilson e mortuaria
 mortuaria microbio variceloso
 e sobre o glabulo pre parcia
 mort de separação dos flos
 dos microbio vacuolizados
 representando como sua forma
 de existencia (?) de microbio -
 Com uma cultura fta em
 cult. com pente proveniente de
 base da m. cabia foi cheie m.
 Saço de collodion que foi in-
 troduzido na car. penitencia
 da 2^a e 3^a cabia -

111

Ceb. 244r. Pre 38.9 Temp.
 Pellos lisos. Branca no focinho; mancha
 amarella sobre o olho e outra apurada, preta
 sobre o olho e amarella sobre a outra do
 lado direito, larga mancha preta transversa
 sobre a metade ant. do corpo. Branca no focinho

10 de Ven. S.E. (Hall) 4. 775 - 38.6
 S.F. (p. al.) 1 760 - 38.8 - 2 635 - 38.9
 S.I. (Terni) 2 462 - 39.1
 Col. tub. A = 637. B. 280 pr.
 Col. m. com elev. 3 232 - 38.7 - 4 217
 38.5. 5 38.8.

11 de Fevereiro S.E. (Hall) 800 - 38.4
 S.F. (p. al.) 1 785 - 38.6 - 2. 637 - 38.7
 S.I. 2 465 pr. 38.7
 Col. tub. A = 635 pr. B. 290. 38.4
 Col. m. e elev. 3 241 - 38.5
 4 217 - 38.2 5 201 - 38.4
 - Foi recolhida uma nova
 porção de soro do *Cryptosporidium*
 dos quais já se tinham colhido
 soro a 9-2-01.
 - Foi distribuída soro recolhido
 a 9-2-01 - que tornam a dar
 após precipitação dos dematários.
 - Foi inoculado o cur. 5

com 18cc de soro de póte 1/16

12 de Fevereiro S.E. (Hall) 4. 770 - 38.9
 S.F. 1 775 - 39. - 2 640 - 38.7
 S.I. 2 472 - 39.
 Col. tub. A = 612 - B. 280
 Col. m. com elev. 3 232 - 38.7 - 4 212 - 38.2
 5 193 - 38.5.


- Foram colhidos na
 estufa o frasco de soro
 preparados a 11.
 - Morreu a cabra na
 peritonite da qual foi colhido
 o soro de colólio a 9-2-01
 Epifita a autopsia. Exa-
 tion ne ne peritonite com
 exudate onde podem encon-
 trado numerosos micróbios.
 com a morfologia de micróbios
 de póte. Foi retirado
 o soro 5 continha um

líquido turvo, que foi
aspirado asepticamente.
Nesse líquido foram encontrados
muitos *Coccobacillus*
não vacuolizados. Com
esse líquido foram feitas
inoculações em agar e
em caldo, e após 24 h.
cabe foi inoculada sub a
pelle do abdome de
uma coelha.

112

13 de Fevereiro S.E. (H. alt.) 4. 777. 38.7
S.F. 1. 782. 38.5. 2. 635. 38.8
S.I. 476. 38.9
Cabo. inv. com des. 247. 38.7. 217
38.5. 212. 39.
Cabo. tub. A 635 B. 485.
— Foi distribuída a parte
de soro. Do 4 tubo de
sangue proveniente do 2^o

origem de cor. 2 por com epu-
lato 1500cc de soro.



— Foi preparado um soro
p. cultura de *Anopheles*

14 de Fevereiro S.E. (H. alt.) 824. 38.4
S.F. (H. alt.) 1. 815. 38.7. 2. 675. 38.6
S.I. 2. 447. 38.5
Cabo. inv. com des. 252. 38.4
225. 38.4. 210. 38.5.
Cabo. tub. 1. 645. 2. 300.

— Foi examinada e produzida
de centrifugação um ^{líquido} *Cymophagus*
aspirado e de cujo antecedente não
há ora ignorado. Ne depositos
foram encontrados *Cymophagus*
e algumas grandes células de
núcleos. O líquido não foi
recolhido asepticamente. A proxim-
idade de bac. da tuberculose foi negada.

15 de fevereiro S.E. (H. ad) 4 780. 38.9
 S.F. 1 815. 38.6. 2 - 672 38.7
 S.I. 2 464. 38.9.
 Cal. m. d. def. 3-262. 38.8
 4-230. 38.5. 5-217. 39.0
 Cal. tuberc. 1-657. 2-295

Foram colhidos alguns mosquitos
~~Anopheles~~ ^(Anopheles) ~~em casa de Dr. Am. Duarte~~
~~em casa de Dr. Am. Duarte~~ foram encontrados
 formas anulares de hematozoários
 (p. estivo autumal) com na tubra
 Coreocida (de Anopheles) - Os
 Anopheles colhidos ^{anteriormente} foram ^{ou após} ~~colhidos~~
 de Dr. Albimarus ^{de Thel.}
 Antes já tinha encontrado em
 casa de minha residência a uma do
 Voluntário um pequeno Anopheles
 que foi ^{anteriormente} ~~colhido~~ de Anopheles
 costalis.

16 de fevereiro S.E. 4. 820. 38.7.
 S.F. 1. 800. 38.5. 2 687-38.9
 S.I. (p.) 2 - 470. 38.5
 Cal. m. d. def. 3-267. 38.7 = 4 235
 39.1. 5 225. 38.8.
 Cal. tuberc. 1. 655. 2 305.

Após a prova negativa de
 malleína foi inoculada o
 cor. 12. com 1cc de uma
 emulsão de leac. da parte a 1:16
 esterilizada a 75° em 1 hora.
 Foi examinada após 24h
 fugaram o depósito o um
 líquido peritônio vaginal
 recolhido asepticamente. Foram
 encontrados numerosíssimos
 lymphocytes, alguns hemácias.
 Com o líquido foi injetado
 na cavidade peritoneal a
 seguinte colônia:

113

Cebéia 380 gr. 39.5. Pellos
ampliados. Pêta. Mancha branca
na linha mediana da cauleça
prolongando-se para o focinho
por toda a parte esquerda
olho esquerdo orlado de amarelo,
olho direito amarelo; pernas
muito amarelo no dorso. Mancha
branca no frusto traseiro esquerdo
comprehendendo a pata. Pêta pos-
terior direita branca — — —
Esta cebéia morreu a 5 h. det.
de choque peritonal — O líquido
foi deixado em repouso após se
deixar precipitar todos os corpos
em suspensão.

17 de fevereiro. S.E. 4. 862 gr. 38.8.
S.F. 1. 843. 39. 2 707 38.7
S.I. 2 488. 39.
Ceb. inoc. des. 3 285. 38.7. 4 260. 38.8. 5 233. 38.8.
Ceb. tub. A. 702 gr. B. 320 gr.

18 de fevereiro. S.E. 4. 810. 38.6
S.F. 1. 815. 38.7. 2. 675. 38.6
S.I. 2. 477. 38.8.
Ceb. inoc. com des. 3. 277. 38.5. 4. 252. 38.6
S. = 237. 38.8.
Ceb. tub. A. 667. B. 307.
19 de fevereiro. S.E. 4. 810. 38.3
S.F. 1. = 817. 38.4. 2. 675. 38.3
S.I. 2. 472. 38.9.
Ceb. inoc. com des. 3. 287. 38.8. 4. 261. 38.6.
S. = 247. 38.8.
Ceb. tub. A. 668. B. 309.
20 de fevereiro. S.E. 4. 852. 38.6
S.F. 1. 862. 38.5. 2. 722. 38.6
S.I. 2. = 485. 38.9.
Ceb. inoc. com des. 3. 290. 38.7. 4. 267. 38.3
S. 245. 38.8.
Ceb. tub. A. 690. B. 297.
— Com depósito de líquido
de hyococle peritonal vaginal
colhido a 14 foram feitas preparações

com microscópios me revelam
a presença aqui que excede
de lymphocyte - O effeito
de cor vermelha escura que
a achava esplançada for-
mando uma membrana
extremamente consistente que
não pôde ser aspirada
por meio d'uma seringa. Foi
retirada por meio d'uma
alça de platina e introduzida
numa casa feita na parede
abdominal d'uma cobrinha
apoi decollamente de appli-
cada a ferida, suturada
e coberta com collobio. A
cobrinha injectada já tinha
apresentado p' curar de sangue
dum carote e tinha a
região caracteristica.
Cub. Par. 49 p. 1. 38.2.

Tachinus maculosa - Branca
mancha amarella na instade
superior do dorso e se estende ac-
cade direito e facinho. Mancha
preta na orelha direita, melange
de a pitais e p. tra. Bactria
escura branca com papen. mancha
preta. Mancha amarella com
tracira -

Com o nome e a condicionante
de sero -

~~Estado da cobrinha~~ -

- Foi colhida num coridabe
na garganta d'um pombo
afectado de oiphteria e
com elle semeados 4 tubos
de agar com e o fm. de
abster. e colônia repurados
onde os tubos collocados em
estufa a 35° -

Com o nome enfraquecido

e colocados em estufa
a 37° foram feitos largos
reencastros em caldo.
As preparações directas
não mostraram.

21 de Fevereiro. S.E. (fall.) 4. 812_{gr} 38.5
S.F. 1. 835 38.6 2. 687 38.9
S.I. 2. 470 39°
Calc. mic. c. clo. 3. 285 38.8 4. 257 38.5
5. 240 38.7
Calc. tuberculos. A. 585 B. 280.
Calc. mij. hij. hyphocell. 555_{gr} 39°
— Foi de novo injectado com 2
com 20cc emulsão de cul. v. de 7/26 de
posto a 1.16.

22 de Fevereiro. S.E. (fall.) 4. 803 38.8.
S.F. 1. 818_{gr} 38.7 2. 670 38.6
S.I. 2. 485_{gr} 38.8
Calc. mic. com clo. 3. 290 38.6 4. 262 38.4
5. 247 38.8.

Calc. tuberc. A. 678 B. 272_{gr}
Calc. mic. hij. hyphocell. 567 38.9.
— Foram feitos cultivos com
preparações com as colónias de
vidos nos testes coroados com
material cellulo na garganta
de pombo affectado de difteria.
Foram isolados um bacillo pleomorfo
e um staphylococo.
— A colónia injectada com
pus injectado de tuberculos em
apresentara um
gonglio insignificante augmentado
de volume. O gonglio foi ex-
tirpado sendo se verificou conter
pus. Com elle foram feitos pre-
parações microscopicas.
— Os gonglios reencastros com
os ^{contidos} frascos ~~contidos~~ contendo Sore Thome
não apresentaram cultura visivel.
Foram conservados até a 37°

23 de Fevereiro S.E. 4 810 38.8

S.F. 1 857 38.7 2 705 39°

S.I. 2 477 39°

Calc. min. elev. B 285 38.4 4 265

38.7 5 245 38.5

Calc. min. L. hypodale 582 38.8

Calc. tuberc. A 685 B 272 -

- Tântum a a carpição
de car. S. - recolheu de a grana
1 litro de sangue -

24 de Fevereiro S.E. 4 185 38.7

S.F. 1 830 38.5 2 670 38.9

S.I. 2 477 39°

Calc. min. elev. 3 292 39° 4 265 38.6
5 252 39°

Calc. tuberc. A 135 B 277

Calc. Lj. hypodale 572 38.4

25 de Fevereiro S.E. 4 795 38.5

Form. aneth. S.F. 1 887 38.8

100 pesos de peso S. 685 38.7

S.I. 2 467 39.2

Calc. i. elev. 3 305 39. 4 287

39.1 5 265 38.8

Calc. tuberc. A 700 B 282 -

Calc. Lj. hypodale 002 38.6

- Foi injectado o car. 9 em

doe. aneth. de pele a 1.16 -

- Foi injectado um rato de
carap. com uma cultura de pele
em caldo -

- A cultura testamunha injectada
a 8 de fevereiro com 9.4 de cult.
de pele em caldo morreu a
4 h. da tarde. A autópsia revelou
as brancas da pele opacas.
Foi retirada rapidamente o baco
e depois a tuberculada com ar
foi semeada em agar.

26 de Fevereiro S.E. 4. 180. 38.7
 S.F. 1.830 - 38.9 - 2.637 - 38.7
 S.I. 2.463 - 38.9
 Ab. inf. des. - 3.293 - 38.8 - 4.270 - 38.6
 S. 257 - 38.8

Col. lip. hydropica 500. 39.
 Col. tuberc. 1.675 - 2.280 - 3.625

— Foram ^{sta} culturas com sempre
 provenientes de parte do tubo (C. longa)
 — O tubo de agar comendado a
 25 com fac. da colônia apresenta
 uma cultura constituida por
 bacillos na maioria não coagulantes
 do. — Com essa cultura foram
 inoculados as 2 ex^{tes} colônias, sendo
 uma com saço de colônia no pen-
 lize e outra por via sub. cutanea
 (cava) —

Colônia - Peso 205gr Temp. 40.4. Pute e
 muita colônia amarelada. Mancha amarela
 no lado esquerdo de facies. Pute anterior

113

direita preta - Apoi Caparistoma
 foi introduzida na cavidade peritoneal
 num saço de colônia contendo cultura
 glicermada semeada com bac. do tubo

114

Col. - 195. Temp. 39.5 - Pute e colônia
 pellos amarelados; mancha preta no
 lado esquerdo de facies, que se
 prolonga à direita do mesmo lado
 Pute. traçado branco. Pute. anterior
 preto. Lado direito de facies branco
 ligeiramente em uma cora preta sobre
 a pele de absterio com 2 vir
 cult. de 24h. de parte, em agar

Foram engraftados na
 4 litros cada um os caridos n.
 5 e 8 - No. e den o mínimo
 accipiente durante a operação

27 de Fevereiro

S.E. 4.825. 38.8
 S.F. 1.890 - 39.2 - 2.682 - 38.8
 S-I 2.470 39.1
 Col. inf. lip. hydropica. 605 - 38.5

Cal. inj. oleo. β 297.38.5 γ 305.38.8

δ 286.39.2

Cal. tuberc. A 702. β 295. C 645

— Foi um fiascoado 4

litros de soro (cor 5 e 8) —

— Foi feita uma preparação com uma cult. de bac. da pele de 48h. as formas vacuolizadas começam a esburacar. Ha formas filamentosas metachromaticas, em massa de mais um pequeno número (Thiomicroph).

28 de Fevereiro β 4.840. 39.2

S.F. 1.635. 2.695. 38.8

S.I. 2.477. 38.7

Cal. inj. oleo. β 302.38.7 γ 305.38.9

δ 282.39.5. — Cal. inj. lipid

hydraulic 1.619.38.7. Cal. tuberc.

1.700. 2.300. 3.570

— Foi injectado a

carallo 4 com 20cc de emulsão de bac. vivos a 1:16

— Foi feita uma preparação com uma cult. de 24h de 72h

De Março. S.E. 4.810.38.9

S.F. 1.607.39.8. 2.677.39°

S.I. 2.477.38.9

Cal. inj. oleo. β 307.38.7 γ 310.39.2

δ 282.39.4.

Cal. inj. lipid hydraulic 630.38.5

Cal. tuberc. 1.707.2.305.3.672.

— Morreu a cobain injectada com 0.2 de soro de cor. 2 e 0.4 de cut. de pele n. da S de Fer (Cal. n. 107) A autopsia revelou a presença d'um pequeno ganglio inguinal infl. parecido em cuji pois não foi encontrado o bac. da peste. Não existiam as lesões da peste chronica p. 14 de 2

Bac. em cuja pulpa não foi en-
viada a microlis da pele (prothia).
Não foram feitos cultivos!
— Foi encontrada morte o
rate injectado com pele a 25.2
(aba n. 1). A autópsia revelou
alguma lesão tumefactiva com
g^{ra} hyperemia da região superi-
nor, onde se encontraram tumores
em lue. da pele. No ponto de
inoculação havia uma extensa
placota infiltrada e necrosada.
Correspondente ao ponto de
inoculação havia um foco de
peritonite onde pululavam os
lue. da pele. O bac. não
apresentava de anormal e os
fórtis com elle pates. Dermy
amplada referta. — Foram feitos
ex. vivos em agar com sangue
do coração —

2 de Março. Cal. inj. lue. 3. 319. 38.5. 2 312
39. 3 285. 38.8.
Cal. inj. lip. hygrode. 632. 38.9.
Cal. inj. lue. A. 305. 36.6.
— Foi encontrada morte
a 1-3 uma cal. injectada com
sangue de cor 5 a cal. n. 96. A
autópsia revelou ter sido a
morte causada por g^{ra} contusão
da parede abdominal devido
prolapse n. 1 e lesão de animal
(macho) com os dentes com elle
encerrados na mesma gaiola.
— A cal. inj. lue. com
pele (cont. de bac.) a 26.2. 31.11.4
acha-se bastante doente. Foi
sacrificada do meio de chlorofo-
rmo e depois autópsica. — Foi
feito cultivo em agar — Dermy
sem exatidão no ponto de
inoculação — Bac. criados

de pseudolacuna punctiforme. O
baga por revestido asperiticamente
tuberculado com areia e com
elas remeados 3 tubos de ap-
glyc. e 1 de color glyciniforme.
Tocam experimentado as so-
ras cov. 5 e 8. rend. injec-
as aperturas cabendo com cov.
e 0^o 4 de cult. Em cult. de 4 ph.
de lico. da parte isolada de baga
linha cabida.

Sora cov. 5.

115

Col. 1. Testomunha. *Endrinia* em
cabega - 405 p. - 39° C. - Delle
arrepia de - parte e mior - Calce e
parte, d'ous mior - Frangir mior de
de parte e mior - Macha mior in
lado opposto e fronte. Delle
anterio e parte e posterior de mior.
Zagradate solo a pelle de alburno
com 0^o 4 de cult. de parte in cult. (4 ph.),

116

Col. 2. *Endrinia* em *Endrinia* 275 p.
39.7 - Delle arrepia de Macha
amarela na orelha esquerda. parte
junta e e formando uma sola
de alto de mior lado. Macha
amarela na parte posterior de orelha
Parte de corpi branco. Injetado
com inna mior de mior formado de
parte mior -

0^o 2 - Sora

0^o 4 - cult. em cult. (4 ph.)

1^o 4 - aqua mior de mior

117

Col. 3. *Endrinia* na cabega - 187 p.
40.3 - Branca e preta. Delle lico
Macha branca na alto de calce e
prolongando a sola a orelha. Macha
branca na metade inferior de sola
directa e posterior e se prolonga a sola
directa de preta. Macha branca de parte
e de orelha e lateral e envolve o ap-
Partes ant. pretas posterior brancas, de

De corpo preto. Insetada a pele
e peluda abdômen com crepe
misturada.

0"4 alt. de porte

0"6 - Pêra

1.0 H²o - phryniel.

118

Col. 4 - Violeta no fragor. 17/18
39"9. Delle leve. Branco, ruiva e
preta. Mancha branca no pescoço
estendendo-se p^a dorso e joaneta.
Mancha negra no dorso. Cabeça
joaneta. Mancha ruiva a parvita
da orelha direita. Quatro patas
direitas ruivas. Patas posteriores
e anteriores escuras brancas, fimbria
diversa supra. Orelha de corpo
negra. Insetada a pele e pelle
do abdômen com.

1" - Pêra

0"4 - alt.

0.6 H²o phryniel.

Carde S.

119

Col. 1 - Testemunha - Pêra 30f 40
Delle anequiada. Branco, preto e ruiva.
Separete anterior de corpo branco com
mancha preta no meio da primeira
e na linha mediana e se prolonga
p^a baixo circundando o lobo. Das
patas no dorso. Mancha ruiva
na transeira, prolongando-se a pata
esquarda posterior. Mancha branca
na moimura superior de cada dorso.
Orelha direita ruiva e escura branca.
Insetada com 0"4 alt. de porte
e 1"6 H²o phryniel.

120

Col. 2 - Violeta no fragor. 372p
39"8. Delle anequiada. Branco
e ruiva. Mancha ruiva no lado
esquerdo do fragor e esquerdo
da primeira, prolongando-se ao
parvitar da orelha. Delle do
corpo branco - Insetada da pele

a pelle de el domem com a
est^a mística

0° 2 soro

0° 4 cultura de pele m. caldo

1° 4 H^o plupialop

121

Cal. 3 - Fuchman na cabeça.

237 pr - 39° 4 - Delle lica. bruno

e preto - Mancha branca no dorso

q se prolonga. a parte anterior

Mancha preta na cabeça - Sobrapp

directo amarello. Mancha preta na

metades inferior de corpo; mancha

amarella na trazeira. Parte post

rior esquerda branca, mancha q

se prolonga a unca de m. lado

Injetado com a pelle de obitua

com:

0° 5 de soro

0° 4 de cultura

1° 0 H^o plupialop

122

Cal. 4 - Fuchman m. trazeira - 17/4 39°

Delle lica, macha preta no dorso

que se prolonga a parte anterior

Parece e cabeça branca. Ohi cran

dado sima ohi negra, sendo

7 e de esquerda prolonga a un

mancha dhi a boze de parillo

de arilha do m. lado. Mancha

amarella na metade inferior

de corpo - q se prolonga a truka

mediana do ventre. No lado

esquerdo e na mesma espia

mancha branca q se prolonga a

parte posterior de esquerda. Cal

Injetado com

0° 4 cultura

1° 0 soro

0° 6 H^o plupialop

3 de Março Cal. inj. m. do. 3 323. 38.4. 4 326. 38.8.

5. 295. 38.5 - - Injetado A 1/19 B. 315

C. 687 - Dipe de lyp. do. 630 pr



mentis apresentando: Em um com limites exte-
rios salientes, apiculiformes. Em duas
proporções e representando sobre se-
lão corada, mas na maioria, espe-
cialmente quando são coradas, verificando
costume supint apresentando por um
arco diagonal. Em outras
corpos mais nobres e também a por-
mento laterais nobremente con-
do mas sem espiculos, que em-
toda as formas são terminais.
Em uma propagação (Morris Smith)
notar-se que o corpo mais formoso
começa por um estereotipo hexastomoi-
ligado pelas apresentando placas,
apresentando e todo como se
uma linha em que o pro-lattis
formam ellipticas. A maior ou
do corpos e extra cellular
em todo caso (Berthé Horst) verifi-
ca-se forma perfeitamente

8A RT CC DC: RE: 7P. 57. 1. 4. 34

2. Contusio capsulae - Granulosa
colorandi et cum venis rubi pila
corinae apparente come pila raris
ante cecidit affectando et vix
a forma 2. in crescente Capsula
f. diti extra zona central
e a capsula exite non opae
annulati involos -

5 de Março

Ch. mic. com. der - 3 Nov. 98.3 4298.885
J. 290-39.

Lib. inf. liquid hydralic - 1.617-38.5
Cal. Tuberculosa A-700gr B-305 C-56gr
- Foi infracata e com co-
cas-5. A zona em deposito mostrando
uma camada de hematina e
de mat. albuminoides e se
depositou sobre a forma de fila-
mento branco e f. pouco solen-
propriedades pela acção oxigenante do ar
- Morreu em 24 a 48 horas

n. 113 repositório da mal. for
colleção um pouco de colli-
contido calor glyceriade amarelo
com lue. 7a parte. O todo
não foi bem fermentado. A
autógena regular a presença
e imo e peristomite com estrobile
soro-sanguinolento. O bac.
apresentava pseudosporos. Foram
feitos preparações com o estrobile
peristomide e com o bac.

O soro de collição continha
um líquido transparente
na mal. e exame microscópico
não revelou a presença de bacilli
na parte. Com o conteúdo do soro
foram feitas culturas em agar
e caldo glyceriade.

7 de Março - Col. inf. de 3. 302-385. 4. 305-388. 5. 292-307
Col. inf. hipocrite 620-389
Col. tubac. A-685-2-307-3-622p

7 de Março - Col. inf. repositório com 096 de
novo soro. 5 e pte foi encoberto
morta. A autógena não ven-
lou as bact. da parte. Havia apenas
um pouco de ganchos coriáceos
na região inferior. Foram feitos
preparações com o bac. ganchos -
Essas preparações mostraram a ausência
de bac. da parte.

Col. inf. Com de 11. 3. 327-389. 4. 330-387. 5. 292-
39. Col. inf. com l. hipocrite 1. 622p-386
Col. tubac. A-740-B-320-C 10p
As culturas feitas com soro de collição
estão contaminadas por coli (?)

8 de Março - Col. inf. de l. hip. de 3. 312-387. 4. 302-385
5. 293-387 - Col. inf. l. hipocrite 562-385
Col. tubac. A-702-B-312-C 67p

124

cultura de hidr foi inoculada na
- pele do abdômen por meio de injeção
com a agulha e sonda.

Em 36 p. T. 39,1 - Parte Manduca
amarela e branca ao lado esquerdo
do abdômen - 5^{ta} manduca branca em
lado e lado esquerdo da cabeça.
Manduca amarela ao lado esquerdo da
cabeça abrangendo olho e antena.
Injetada com cultura em ago. 488,
por. da boca.

- Foi transada parte de
sêr de car. 2 (Não há diferença
de marcação sêr por meio
orifícios da língua e de papil
nos foros da comera).

- Foi corado uma preparação
de sangue paludico de leishman
Chenivsky, no estufamento
e (Fornier) -

- Foi encontrada morte a

col. 109 injetada a 8-2-01
com lcc de sêr de car. 2
e cultura na manduca
de parte Comptac e hamonchi
por injeção com 1 agulha
e sonda. Das placas de Papp
Foram feitas proctas com: Ede
inibentes da parte thoraco
abdominal. Não corificadas do
parte de inoculação - Sangue
afinco e lcc. Essa preparação
teram cultura negativa para
a existência de lcc. de parte.

12 de Março

Col. inoc. deo - 3-317-385 - 3-340-383

3-310-385 - Col. (hyde 530-587)

Col. tuberc. A. 130. B. 341. C. 712

- Foi feita uma cult. em caldo com lcc
de parte e com de uma cultura em
gelatina por parte q foi colhida em estufa
a 35°

- A preparação de in. paludico

habada pila pro. Chenzimsky akus
len cydn posm a chromatinu do
pand. orovic nua fi corals.

— Foram encontrada mortas
uma cabraia hibernante e a
cabraia inoculada com 5"2 de An-
te carallo 5- — A antena da
1ª (ant) revelam as típer caradendo
da parte a 1 foi largamente compo-
nido pelo exome no exome —
A antena da abn, com rare verde
a presença de duas superfícies
simples, nas viras, sem evidentes
frie-simples — O pulso Lihue
a pulso ^{suavizada} suavizada e nels o que
microscopio uma apelo no
numeroso insignificante de brach
de parte (2 a 4) O baco apelo
na água De naridos brach

13a Mince, Col. in, also 3 340-384 2 340-384

5-308-38.5 Col. P. hyemale 1 548 38.5

Cal. tubers. A. 732 B. 345 C. 100

14 de Años. Est. inf. com. alio - } 345 384 4 350 385 5 339

Col. l. hypomela - 537-38.8 - *Col. l. lutea* 715

B. 350 - C. 752

74)

* Foi injetado com 2 cm de
de amêlase

15 de Março. Morreu injetado 3 ratos brancos
(2, 3, 4) com a inj. de 20 cc de
Soro de Cor. P.

2 - Rato - 0,2 soro 0,4 auto inj. 700 e 0,2 soro

3 - Rato 1^o soro 0,4 auto inj. e 0,2 soro phy.

11 - Rato 10,4 auto e 0,6 soro phy.

Foi injetado e vivo da 2

Col. inj. des. f. 3 357. 38.9 4 365. 38.3 5 362. 38.5

Col. inj. lig. hydra 1 537. 39. Col. tuberc. A 760

B. 347. C. 782

16 de Março. Desfig. tor. 3 362. 38.4 4 353. 38.7 5 355. 38.5

lipid. hydra 547. 39.3 Col. tuberc. A 727

B. 348. C. 765

injetado com soro de 9

e de alguns soro p^o m. de cultura

17 de Março. Des. de fig. de bacalhão 3 359. 38.7 4 352. 38.7

5 337. 38.5 - Lipid. hydra 553. 38.8

Col. tuberc. A. 733 B. 359 C. 780

75

18 de Março. Col. inj. com des. f. 3 372. 38.9 4 302. 38.4

5 347. 38.5 - Col. inj. lig. hydra 542. 38.6

Col. tuberc. A 720 B. 415 C. 720

- Com uma cultura pura de bac.
da peste em agar foram cementados os
2 ratos, assim se verificou a for-
mação e evolução da forma arredondada
e da forma de torção da molécula

1. Agar glicerinado e peptonado

2. Agar glicerinado sem pepton

3. Agar sem glicerina e pepton

4. Agar pept. glicerinado com soro de
de contensão f. de 1 em 1 em
rel. de lipid. a 1:50

- Foi injetado com 9 em 20 cc
de soro de cultura de soro

19 de Março. Col. inj. com des. f. 3 377. 38.4 4 362. 38.3

5 342. 38.7 Col. inj. lig. hydra 540. 39

Col. tuberc. 1 732. 2. 360 3. 524

- Morreu a cultura n^o 124
injetado com peste a 11-3-01

76)

86.15 CC. OC. PI. TP. 57.1. f. 39. V

Foi injectada sob a pelle do
abdome com uma cultura de 24h
em agar de peite a seguinte cultura:

125- Cob. - Dico. - 163 Temp. 39.6
puta e virava pellos brancos. Mancha amarela
no flanco direito. Mancha amarela no lado esquerdo
e parte. Mancha amarela no lado esquerdo e parte.

— Form. p^{ta} propagação em
as cult. de peite p^{ta} a B em diferentes
meios. Contida agar —

— Foi examinada um par de
abscos de figado. O exame
microscópico revelou a presença
de microorganismos. Foi inoculada
sob a pelle a seguinte cultura:

126 - Cob. - Dico. 380p Temp. 39.9
Cór puta - Pellos
ampliados —

86-196

86.15 CC. OC. PI. TP. 57.1. f. 40

77

Foi inoculada e car. 4. cultura
cultura de peite p^{ta} a B em diferentes

20 de Março. - Cob. inj. e. dco. - B. 789. 78.6 - 366. 38.1

S. - 352. 38.5 - Cob. h. p. h. dco. 547. 38.9

Cob. tuberc. A. 707 B. 358 C. 532

Cob. inj. p^{ta} de figado. 377.

— Foi injectada e car. 12 com
2cc de sumário de peite morta

— Foi examinada e São Lucas. O
unde inoculada com misturas de
peite e peite a seguinte cultura

127

Cob. - 1. Testemunha. Tuckner
na cabeça. Dico. - 194p. 1. 38.7.

Pello longo e amarelado. Preta.

Mancha viria na parte lateral esquerda
do abdome. Mancha viria na parte lateral
esquerda do peite. Mancha branca no flanco
esquerdo no 2. precedente. Mancha putrefa
da viria esquerda. Injectada com
uma mistura de 0.4 de cultura a
cultura de 11 dias e 0.6 de cultura de 11 dias

77-196

78

BL 13000 OC. PT. TP. 57.1.f. 40.0

128

Cob. 2 - *Trichana nitens* P. 194
 Temp. 38.6. De do longo e arredado
 direita. Injetado com exp. mediana
 0.4 cultura
 0.2 sôco
 0.4 de 148 *phrydipica*

129

Cob. 3 - Tiroleta na cabeça
 Estão longo e arredados -
 Dico-184p Temp. 38.5 -
 Mancha branca na parte anterior
 facista. Manch. amarela sob e
 other exposto. Mancha branca linear
 na parte mediana de cabeça
 P^{te} - Mancha branca na parte posterior
 Injetado com uma injeção de:
 0.5 de sôco
 0.4 de cultura
 0.1 de 148 *phrydipica*

BL 13000 OC. PT. TP. 57.1.f. 41

79

21 de Março Cob. inj. de sôco 3 400. 38.5 2 375. 38.2
 3-360. 38.5 Cob. e l. hipocle 590. 38.8
 Cob. tubera A 377 B 377 C 377 - Cob. inj.
 por abaco de fíg. 392

- Foi injetado com 11 com 400
 de cultura de cult. de parte rna -
 - Foram manipulados em dia abaco
 futor de sôco para cultura

22 de Março Cob. inj. de sôco 3 387. 39. 2 342. 38.5 3 342. 38.3
 (vista e de trás) Cob. inj. l. fíg. 1 315. 38.4 -

Cob. tubera A 325 B 325 C 322

Cob. inj. por abaco de fíg. 375 m.

23 de Março Cob. inj. l. fíg. 532. 38.7.

Cob. tub. 1. 777 2. 477 3. 355

Cob. por abaco de fíg. 1 312

- Foram injetados em parte rna
 com 300 de abaco de fíg. com tubera, sob e
 oposto ao abaco 1. 2. 3.
 Foi tirado o sôco da 4 que apresenta
 lactante e fluorescente (a epa da parte)

- 24 de Março. Cob. inj. de S. 335.38.5 K 327.38.5 J 330.38.6
 Cob. inj. l. hydrae - 1.515.39.3. Cob. tub. 1.715.2.38.0
 B. 485. Cob. inj. p. de de p. 373.
 25 de Março. Cob. inj. de S. 336.39.3 K 330.39 J 327.38.3
 Cob. l. hydrae 532.387. Cob. alen. p. 383.
 Cob. tub. A. 760. B. 367. C. 490.
 26 de Março. Cob. inj. de S. 334.38.5 K 330.38.4 J 340.38.8
 Cob. inj. l. hydrae 1.537.38.7. Cob. p. de de p. 378.
 Cob. tub. A. 757. B. 370. C. 485.

— Foram encontrados matas as
 cabeças n.º 127 e 128. Testemunh. - insetos
 com 0.2 de s. de s. de s. a 20.3.01.

A autopsia revelou tórax moído
 amarelo e amarelado de parte, e cabeça
 infectada com 0.2 de s. de s. e por tanto
 mais peritômica em inj. de s. de s.
 encontrada. Cabeça putre. E p. de s. de s.
 ocasionalmente de inoculação a peritômica
 dentro da pele. Foi encontrada a
 camente 1 g. de inj. de s. de s. de s.
 e com de s. de s. de s. de s.

O corpo de s. de s. 2 rec. de s. de s. a 16.3.01
 abito e 37.º apresentando internamente
 transparente em alguns pontos e opaco
 em outros. Em n.º 1.º havia no m. de s.
 uma crosta em felticidade peritômica.
 O exame microscópico e intra e extra
 e após coloração mostrou no m. de s.
 constituição por massas ac. e p. de s.
 A preparação feita com o corpo
 houve matização e restou de
 abito aluminoso(?) - Não havia
 microb. - Foi largamente
 amarelo com tórax tórax calbe
 peptonizado, de s. de s. de s. (testes 35.)
 Foi feito de s. de s. de s. de s.
 facilmente contaminado em fresco
 de s. de s. com um pouco de
 s. de s. de s. e de s. de s. de s.
 inj. de s. de s. e de s. de s. de s.

- 27 de Março - Cob. inj. de s. de s. de s. 1.345.38.8. 2.320.38.2
 3.337.38.4. Cob. inj. l. hydrae 522.38.9

Cab. inj. p. de f. 377.

Cab. tub. A. 740. B. 362 C. 488.

— Foi sacrificada a cab. 125 inj com peste a 19-3-01. Com o baco uterino aspticamente foram feitos cultivos.

— Os cultivos feitos com o sangue da cobra morta a 26-3- esturam desenvolvidos e com ella foi madei-
sado a pelle do abdomen a epine:

130 - Cobra - Peso - 190 gr. Temp. 38.8.

— Foram sangrados com 4 litros o carallos 5 e 8.

28 de Março - Cab. inj. deo. 1. 350. 38.3 2. 320. 38.5 3. 342. 38.8

Cab. inj. ly. hydn. 550. 39 Cab. inj. p. de f. 400.

Cab. tub. A. 762 B. 367. C. 482.

— Todos os picos a que foi submetida a soro de cab. 2 foram negativos na ja-
refe a contaminacao.

29 de Março - Cab. inj. de f. de 1300. 38.8 2. 320. 38.7 3. 355. 38.8

Cab. inj. ly. hydn. 7.555. 39.4 Cab. inj. de f. 405.

Cab. tub. A. 805. B. 385. C. 525.

— Foi sacrificada pela Chloroform a cab. B. inj com tubercul. Foram recolhidos aspticamente os sangues e bacos. Estes orgaos foram separadamente tor-
dos em areia e serrados em batata glicermica sendo os tubos collocados na estufa a 37°.

— Foram ensanados os cor. 4 e 5.

— Foi preparado agar glicerinado -
— Foi purificada uma cultura de diphteria.

30 de Março - Cab. inj. deo. 1. 345. 38.5 2. 300. 38.5 3. 342. 39°.

Cab. inj. ly. hydn. 525. 38.7 Cab. p. de f. 390.

Cab. tub. A. 735 C. 475.

31 de Março - Monoclon. o rato - test. e c. inj. com
baco a antipia mortua na tem-
peratura de peste. Com microbio injectado.

atua semitransparente

- 31 de Março - 1-357-384 2-302-385 3-352-383
 Cal. tuberc. 1743 - D. 483 - Cal. l. hyal. 533-386
 Cal. p. ab. fig. 393 -
 1 de Abril - Cal. inj. l. fig. 1-350-387 2-300-385 3-352-388
 Cal. inj. l. hyal. 1-540-387 - Cal. ab. fig. 440g
 Cal. tuberc. 1780 - L. 492 -
 - Foi injectada a cor. S. com 2m
 de emulsão -
 - Foi esterilizada emulsão a 65°
 - Foi fracionada e S. de S.
 verificou-se que os S. de S. de
 emulsão de S. de S. nem sempre
 dão, as contraindições supõem a
 retenção de cor. e facilitam a
 dissolução de hemoglobina -

- 2 de Abril - Cal. inj. ab. fig. 1-350-387 2-352-387 3-360-388
 Cal. inj. l. hyal. 1-570-39 - Cal. p. ab. fig. 425g
 Cal. tuberc. 1-700g 2-490g
 3 de Abril - Cal. inj. ab. fig. 1-350-387 2-300-385 3-355-385

- Cal. inj. l. hyal. 1-590-389 - P. de fig. 435
 Cal. tuberc. 1-790-3-525 -
 - Sacab. injectada com teste a 274
 foi sacrificada a 2-4 com o baco retido
 asepticamente forame p. to. cultivos. Com
 as culturas datando de 24 horas foi
 injectada uma cápsula de 118g. sub
 a pelle de abdomen -

131

- 1 de Abril - Cal. inj. com oleo 1-397-385 2-382-378 3-382-387
 Cal. l. hyal. 1-590-39 - Cal. p. ab. fig. 430g
 Cal. tuberc. 1-785-3-517
 5 de Abril - Cal. inj. com oleo 1-382-381 2-mora 3-380-386
 L. hy. hyal. 563-386 - P. de fig. 435 -
 Tuberculo 1-781-3-519 -
 6 de Abril - Cal. inj. oleo 1-365-378 3-362-39-2
 Cal. l. hyal. 565-385 - P. de fig. 430
 Cal. tuberc. 1-757-3-490 -
 7 de Abril - Cal. inj. oleo 1-370-382 3-395-388 -
 L. hy. hyal. 595-389 - P. de fig. 467,
 Tuberc. 1-780-3-543

8 de Abril

Cab. inj. elev. 1.350-38.8 2.390-36.2

Cab. ly. hyp. 580-38.5. Pin. ab. fig. 455

Cab. tub. 1.785-3-535 gr

9 de Abril

Cab. inj. elev. 1. morre 3-385-38.

Cab. inj. ly. hyp. 560-38.3. Pin. ab. fig. 445

Cab. tub. 1.750-3.480 -

Foi feita a autopsia da cabana
- 1 inseto com alio - Existia
um abomente exposto peritonal
doe semprinalto. Notara-se uma
sempre total de todos os micos
da cavidade abdominal que acharam
muito os membros exp. Difícil
achar a mite a parte abdominal
No intestino ex. em outro ponto alio
granulosa que attingem alguns o
volume d'um feio de leite contendo
uma massa onde existe em abundancia
o alio -

Morre a cabana 131. Como o
animal morre espontaneamente

foram feitas sementiras com os
sempre miquinas e não com o
vaco -

10 de Abril

Cab. inj. elev. 3.397-38.5 - Cab. pin. ab. fig. 1.445

Cab. ly. hyp. 1.570-38.4 Cab. tub. 1.765-3.465

Foi experimentado a sere do 2 onde
feitos injeções de sere e da
cultura em pontos suaves de corpo.

* Foram injetados as seguintes cabana -

Cab. 1. Fuchim neologu - Peso 321 - Temp 39°

Pelle lio Branca - Mancha preta sobre o alio
exposto etc. Injetado com 0.5 de parte
cult. em cold. e 1cc. de sere.

Cab. 2. Fuchim neologu - Peso 187 - Temp 38.4

Injetado com 0.5 cult. e 2cc. de sere.

Cab. 3 - Fuchim neologu - Violeto na cabeça

Peso - 127 - Temp 38.1 Injetado com

0.5 de parte -

Foi também injetada a seguinte

1° vivencia de pin.

Cab. - Peso 134 - Temp 38.3 Cult. substituída por

- 11 de Abril - Cab. inj. de 200. 3.405 p. 38.3. Cal. ly. hypr. 1.175-385.
 Cab. pús. de 200. 475. Cab. tuberc. 1.767-3.515.
 12 de Abril - Cab. inj. de 200. 3.427. 38.3. Cab. i. ly. hypr. 605-385.
 Cab. pús. de 200. 1.480. Cab. tub. 1.797-3.560.
 13 de Abril - Cab. inj. de 200. 3.425-38.5. Cab. i. ly. hypr. 1.100-385.
 Cab. pús. de 200. 1.465. Cab. tuberc. 1.800-3.540.
 Foi injectado o cor. II com 8cc de emulsão.
 14 de Abril - Cab. microsc. de 200. 3.441-39°. Cab. inj. de 200. 490.
 Cab. i. ly. hypr. de 200. 591-38.9. Cab. tub. pús. 3.570.
 15 de Abril - Cab. microsc. de 200. 3.425-38.7. Cab. pús. de 200. 475.
 Cab. inj. ly. hypr. de 200. 1.555-38.5. Cab. tuberc. 1.770-3.500.
 Foi encontrada morte a abd. n.º 134.
 Encontrou-se inj. com parte 10.4.4. A autópsia revelou uma tipica peritonite com a presença de uma grande quantidade de pus e pontos de necrose. Foram feitos preparações com a pílula riscada que deu um resultado de necrose pontual em relação à existência de bac. na parte.
 Foi sacrificado pelo chloroformio.

- a abd. 135 inj. a 10.4 com parte.
 Foram feitos cultivos em ebaço.
 Na ultima cabia os pontos de parte não se tem encontrado.
 Púos mas com edema glândulas de toda a parede thorace abdominal, havendo apenas um leve aumento de volume dos ganglios sem exacerção por ganglionar.
 16 de Abril - Cab. i. de 200. 3.434-38.7. Cab. pús. de 200. 485.
 Cab. i. ly. hypr. 600-38.7. Cab. tub. 1.776-3.558.
 Foi injectado o cor. I com 8cc da cultura de parte.
 17 de Abril - Cab. inj. de 200. 3.444-38.6. Cal. ly. hypr. 605-38.5.
 Cab. pús. de 200. 509. Cab. tub. 1.788-3.552.
 — De novo revelou abundante cultura na tuba semeada a 15 com ebaço da abd. 135. O exame microscopico revelou a presença de coque bacillo como por edemaciados (?) e apresentando nebulosidade um ou mais pontos que a azul de

mitigou cora com intensidade. Com
essa cultura foram coneabos porrofo
p^a inoculação nos caridos e foi miss
sile a pelle do abdomeu uma
cubana de
Foi inoculada o car. 2 com 18ce
de embria de peste.

136

18 de Abril
Cab. inj. do ff. bac. 3-400. 38.5. Cab. inj. ty.
hypos. 615-38.7. Cab. pis. do ff. 510. Cab. tub.
1-800. 3-005.
Foi estudada a ague preventive de Fôu
do car. 2. onde fôrto as injeções de
sôre q deum ex apitos da peste
24h. depois. Foram injectados com
sôre os aft^{os} cubanos.

134

Cab. 1. Inocula na cabeça 1.39. B. 785.
Branca, viva e preta. Lyssata sob a
pelle do dorso com 1ce. de sôre do car. 2.
Cab. 2. Inocula na tegum. 1.39. B. 185.
Mancha preta na metade esquerda do focinho

138

mancha amarela ao lado do focinho
Inj. sile a pelle do dorso com
0.5 de sôre do car. 2.

139

Cab. 3. Viola na cabeça. 39.3.
B. 185. Prea viva e machada.
Serviu de testemunha.
— Foi capturado Felito 2^o qm
de Belle Horgonde a uma fonte
que abastacia um grupo de famílias
afectado de breis. O animal a
10^o foi de 14 mjs. tendo porção
da vida com a de erro.

19 de Abril - Cab. do ff. 3-440. 38.8. Cab. ty. hyk. 527-38.8
Cab. pis. do ff. 1190. Cab. tub. 1/100 3-570.
— Os cães injectados com sôre
a 18-11- focam injectados com
0.5 d'uma embria d'uma cult.
de peste em tubo de agar de 48h.
em 5ce d'H²O phag. —

20 de Abril

Cab. do ff. bac. 440-39.1. Cab. ty. hyk. 527-38.7.
Cab. pis. do ff. 1190. Cab. tub. 1/100 3-540

Foi comprada em 2 litros
caselle não imunizada p^a preparação
de soro p^a mais de cultura.

21 de Abril - Cab. i. des. 3.440-388. Cab. lj. hypt. 597-38.7. Cab. pins et. hy. 482. Cab. tuberc. 1.701-3.538.

22 de Abril - Cab. i. des. 3.455-38.7. Cab. lj. hypt. 1.611-38.5. Cab. pins et. hy. 510. Cab. tub. 735-577.
- Foi injectada e curada com 2cc de emulsão bac. da peste.

23 de Abril - Cab. i. des. 3.455-38.2. Cab. lj. hypt. 1.610-38.5. Cab. pins et. hy. 1.495. Cab. tuberc. 1.727-3.565.
- Foram examinados preparações a fresco e coradas provenientes de sangue da infestação.

24 de Abril - Cab. i. des. 3.445-38.5. Cab. lj. hypt. 600-38.5. Cab. pins et. hy. 1.495. Cab. tuberc. 1.700-3.580.
- Foi continuada a observação de preparações de filaria.

25 de Abril - Cab. i. des. 497-38.5. Cab. i. lj. hypt. 605-38.3. Cab. pins et. hy. 1.510. Cab. tub. 1105-3.565.

A cabra 139 injectada a 19 com peste (cab. testamha) morreu durante a noite de 24 p^a 25. A autopsia revelou as lesões características da peste o que foi confirmado pelo exame bacteriológico - Como os bacilos imputados foram feitos e mentidos em tubo de agar -

Foi inoculada numa cabra de 7 kilos, de 6 mos. de idade de temp. 39.2 com 2cc de alar de fígado de bacalhã esterilizado -

140

Foi injectada numa alaina Violeta m. t. m. (cab. n^o 140) per 22o temp. 38.6. Dada e m. m. h. com uma mistura de 1cc de soro e fígado. Soro d'um caselle não imunizado, m. m. h. p. m. contra a peste e 0.5 d'uma m. m. e o m. m. emulsão d'uma cultura de pele de cabra curada em agar de 48h. ante morte do animal. ^{para fin ab. f. d. u. o.} Começou a a susar a

acqui curativo do Soro do
car. 2. immuniat contra a
pste. P^{te} este foram injectada
com 0.^{cc} 5 de soro emulsao de
cult. de pste (d) em agar. (Pste
de base cab + a 2-IV-01)
as repts cabaias:

141

Cab. 1. Tracheina necelega 39°. P. 200
Pete crua. Cabeça e tronco preto. Mancha
ruia circular no tronco. Pequena mancha
ruia sobre o olho esquerdo. Injectada
sob a pelle com 0.^{cc} 5 de emulsao de
cult. de pste (Soro de base cab + a 2-IV-01)

142

Cab. 2. Tracheina necelega 39°. 210p
Pete preto e branca. Mancha branca
na 4^a anterior direita (se prolonga a repta
psta). Mancha ruia circular no tronco.
Mancha ruia na metade direita do peçoço.
Mancha ruia na 4^a post. direita. Injectada
com 0.^{cc} 5 de soro emulsao de
pste

143

Cab. 3. Tracheina necelega 38.8. P. 190
Pete preto e branca. Mancha branca na
4^a e sobre a psta anterior esquerda.
Injectada com 0.^{cc} 5 de soro emulsao de
pste, e as cabaias anteriores.

Uma certa porcao de
emulsao de pste foi injectada
por Breinde sob a pelle de
Car. 2. Formando um tumor
que abcedou. Recolheu o pus
com 5 foram feito papargos
e nada evidenciar. Na hora miso
vis visivel. Com esse pus foi
injectado no peritoneo a apte.

144

Cabaias - P. 281- 39.5. Bile
arrijado. Branca e ruia. Mancha
ruia sobre a metade direita do tronco.
Manchas ruias sobre o olho. O resto
do corpo branco.

96

BL. PJ. 000 OC. PI. TP. 57. L. f. 48. v

26 de Abril Cal. i. des fig. 3. 455. 38.2
 Cal. liq. hydrot. 1. 605. 38.5
 Cal. pin. des. fig. 1. 510
 Cal. tuberc. 1. 790. 3.500
 Calbra. i. alfig. 8k² P. 40° - Lymphon
 reações na parte de inoculação.
 — As. 3k. t a cub. - 141 injectada
 a 24h. com peste recebem sob a pelle
 de dorso 2cc de soro de cor 2
 (sua a 16-17) Temp., 39° 2 —

27 de Abril Cal. inj. des. fig. 3. 470. 38.5
 Cal. inj. liq. hydrot. 1. 605. 38.9
 Cal. inj. pin. des. fig. 1. 520
 Cal. tuberc. 1. 805. 3.570
 Calbra. inj. des. fig. 3. 7.500. 40.5
 Foi o líquido foi reagido. Não
 ha mais na parte de inoculação.
 — A calcaria 141 - recebem as 2h. soro
 mais 2cc de soro de cor 2. — A
 calcaria 142 recebem pela primeira

BL. PJ. 000 OC. PI. TP. 57. L. f. 50

97

vez sob a pelle de dorso 2cc de soro
 soro —

28 de Abril Cal. des. fig. 465. 38.9. Cal. tub. 1.800
 2. 587. Cal. liq. hydrot. 788. 38.5. Pin. des.
 fig. 525. — Calbra. alfig. 6. 7.500. 39.2
 — As calcaria 141. 37.8 e 142. 38.7
 recebem 2cc de soro anti-peste (cor 2)
 As injectas de soro foram feitas na parede
 abdominal —

29 de Abril. Cal. des. fig. 470. 38. — Cal. liq. hydrot. 580. 38.5
 Cal. pin. des. fig. 570. 38.5. Cal. tub. 1.790. 3.590
 Calbra. des. fig. 7.500. 39.
 As calcaria 141 e 142 recebem de novo
 2cc de soro —

30 de Abril. A calcaria n. 140 morde com peste a
 7cc de soro de cor da mãe numminizada
 succumbiu d'uma peritonte devida
 a perfuração da parede muscular.
 Foi necropsiada imediatamente e ha. c.
 e pe. de fora foi feita entheria —

31 de Abril. Cal. des. 3. 469. 38.4. Cal. tub. 1.782. 2.575

Cabra (dão) 7.600 - 39°.

A cabra injetada com pus de
alcoem de fixado e com a
deposição de líquido de fixado
nada tendo apresentado de
cria da injeção foram
recollidos ao vivo.

A cab. 141 e 142 apresen-
taram sangramento - 39.4.38°
O estado local em melhor
posição: amaria de dor, li-
mificação de sangramento.
Empia - 1 e estado local
e pul de temperatura apresen-
te a cada passo.

1 de Maio. Cul. de fix. bar. 3. 430. 38.8.

Cab. futuro. 1. 190 - 3. 605.

Cabra - 7.500 - 38.8.

A cab. inj. despi. receber
sabe a pelle 2cc de odo estéril.
A cabra - receber 3cc de odo

de fix. de esterilizado.

A cab. inj. de laboratório
nada desenvolveu-se.

2 de Maio. A cab. inj. com odo de fixado de
3.463. 38.9. bacalhau receber sabe a pelle 2cc
de odo esterilizado. A cabra
3. 190 - sem experiência foi injetada
Cabra. 7.600. 39.5 sabe a pelle com mais 3cc
de odo esterilizado.

3 de Maio. Cab. inj. deo. 3. 484 - 38.1. Cab. futuro. 1. 823
2. 509. Cabra - 7.600 - 38.7.
— Torcem injetado com rato branco
com 2cc de vacina anti-pertusa
no dia 1-V-01.
— Torcem feto preparado com
lympho peritoneal de rato branco
após de nella estender-se a
Most sollem.

4 de Maio. Cab. inj. com deo. 1. 3838. 490p
Cab. futuro. 1. 190 3. 530. Cabra - 39. 7. 7p
— A cabra futura 1. foi de

injetada sob a pelle do abdomen
com escara tuberculosa -

5 de Maio. Cab. d. f. 38.5. 480. Cab. tub. 1.777. B. 590.
Cab. 7.700. 38.9.

6 de Maio. Cab. inj. c. d. 4.700. 38.
Cab. tuberc. 1.690. 3.570.

Cabra inj. d. 7.700. 38.8.

145 - Foi injetada sob a pelle do
abdomen com uma escara embren
de cult. de pte em agot. uma
cabaia de 2 P3 pr -

- A agua de Belle Humide
(ponte injetada de proctus e baco)
for examinada no ponto de
uniao dos materias fixos dissolvidos
e deu em 2 exames m. c. m.

14 mg. (19-11-01) e 14 mg. (26-11-01)

7 de Maio. Cab. inj. d. 3.485. 38.5. Cab. tub. 1.690. 3.625.
Cabra inj. d. 7.600. 39. - A cabaia
inj. com d. apresentou um grande
abcesso no ponto de inculcacao, que

começa a realcever-se em breves
aberto -

8 de Maio. Cab. inj. d. 3.475. 39. Cab. tub. 1.672. 3.610.
A cult. tub. 1. morim
1. cult. com sangue Cab. inj. d. 7.400. 38.8.

9 de Maio. Cab. inj. d. 3.475. 38. Cab. tub. 3.590.
A cult. tub. 2. cab. 1. tub.
2. de m. m. m. Cab. inj. d. 7.700. 39.5.

10 de Maio. Cab. inj. d. 3.500. 38.3. Cab. tub. 3.600.
Cabra inj. d. 7.800. 39.2.

11 de Maio* Cab. inj. d. 3.495. 38.5. Cab. tub. 3.590.
Cabra inj. d. 7.600. 38.8.

12 - Foi operado e cor. 7 d'uma espinha
d'uma das patas anteriores -

12 de Maio. Cab. inj. d. 3.525. 38. Cab. tub. 3.637.
Cabra 7.750. 39.3.

13 de Maio. Cab. d. f. 507. 38.5. Cab. tub. 627.
Foram inculcados duas cabaia
1 a 8-5-07 e outra a 11-5-07
a 1. com sangue de rato branco e
a outra com 2cc de sangue de
cavallo (o. normal)

14 de Maio. Cab. inj. d. 3.605. 38.5. Cab. tub. 3.617.
Cabra 7.900. 39.9.

15 de Maio - Cal. inj. des. 3-535 - 38.7. Cal. tub. 660.
 Calbra - 7.800 - 38.8 -
 Um xemente de *Trichobry*
 foi affectado de um paludismo
 caracterizado pelo microscopio
 foram apontados os m. op. p. b.
 existentes no p. b. - Na cavidade
 um único exemplar de *Anopheles*

16 de Maio - Cal. inj. des. 3-515 - 38.6. Cal. tub. 647.
 Calbra - 7.800 - 39.2 -

17 de Maio - Cal. inj. des. 3-500 - 39. Cal. tub. 627
 Calbra - 1.800 - 39.2.
 Foi sacrificada a col. 145 e com
 bac. e sang. foram feitos cult. inj.
 A 15 de Maio foram inoculados
 uma calcaia no peritomeo com
 cult. bac. de p. b. - Foram
 também inoculados uma rã e
 um curculão.

18 de Maio - Cal. inj. des. 515 - 38.8. Cal. tub. 625
 Calbra - 4.300 - 39.5
 Foi sacrificada a col. 146 e com c. exp. p. b.
 peritomeo foram feitos cult. inj. e inoculados
 sobre pelle uma cobrinha.

19 de Maio - Cal. inj. des. 521 - 38. Cal. tub. 627
 Calbra - 7.200 - 39.4 -

20 de Maio - Cal. inj. des. 522 - 37.9. Cal. tub. 634.
 (Secicula) - Calbra 7.700 - 39.6 -
 Motuosa sempre. Foi injectado a cor. 6 com amuleta
 de parte estufa) de p. b. -

- Foi injectado um rate com
 parte ^{0,5 calcaia em cul. b.} de ex. p. b. peritomeo al.
 + a 18-5-07

- Foi injectado um dos ratos brancos
 racenado com 0,5 de cul. b. em
 cul. de h. de p. b. p. b. p. b.
 exp. p. b. peritomeo cal. morta a
 18-5-07 - ann. com um ab. b. b.

- Foi injectado um rate branco
 com 0,5 de amuleta morta de
 bac. da p. b. a 1:16 - (racenado na
 diluida.)

- Foi injectado um cornodry.
 com um cult. de pneumococo
 - Foram feitos de m. op. p. b. (*Culex*)

21 de Maio. Cab. inj. des. 528. 324. Cab. tot. 665
 Cabra 7.900. 39.5
 — Exame crysacquo de urina
 Sanguine de parte —

22 de Maio. Exame crysacquo —
 Cab. inj. des. 3. 515. 38.5
 Cab. tuberc. 3. 652. Cabra Sk. 39.5

Foi de novo injectado | O Comendante injectado com
 acido 1/46 com pneumococo estava moribundo
 Dece de sangue | Foi sacrificado e fr. e - antipni.
 normal e caudo | f. e de se reventou. Com e
 Sangue de coração (spiritus)

23 de Maio. Cab. inj. des. 515. 38.5. O abono que
 se formou no ponto de inoculação
 tende a reabsorver-se - Cab. tot. 652
 Cabra - 8.100. 39.5. No ponto de
 inoculação formou-se um
 abono e tende a aumentar —
 Estando moribunda a cobra 149
 injectado com exulato spirituale pto.
 foi sacrificada e com e exulato

24 de Maio. Logo foram feitas culturas
 Cab. inj. des. 537. 38. Cab. tot. 682
 Cabra inj. des. 1800. 39.
 — Morreu - rate extremamente
 injectado a 20. v. oi. e antipni
 moribundo e a causa de morte naft.
 a pte. — Exame crysacquo
 25 de Maio. Cab. inj. des. 537. 38.4. Cab. tuberc. 629
 Cabra 7000. 39.2.

150

Foi inoculada uma cobra no
 peritoneo com uma cultura em
 caldo de bo. da pte por 28. bge
 da cob + a 23. v. oi. —
 — Foi tambem inoculada e
 este racemato com f. dose a 20
 de Maio assim como uma
 tetanica.

Foi feita comparativamente
 a contagem especifica da bac.
 cyte no sangue e um filaroso
 estirpe durante e dia (sem embriões)

e à noite (com embrião). O
cultado foi o seguinte:

Sangue colhido durante o dia
(alcal de methylum e coar).

Lymphocytes	4
Mononuclears	28
Eosinophils	6
Polynuclears	127
	165

Thrombina plon.

Lymphocytes	2
Mononuclears	24
Polynuclears	98
	124

Durante a noite -
(Kematina - Eosina)

Lymphocytes	5
Mononuclears	21
Polynuclears	138
Eosinophils (2 trimelados e 4 binucleados)	7
	171

26 de Maio Calor. 3.550 - 38.3 Cole. tub. 605
Calor. 38.5 - Sketo

27 de Maio Cal. m. dia 3.530 - 38.3 Cole. tub. 640
Calor. 8.200 - 38.8.

Exame microscópico de urina
Lencocitos de urina -

28 de Maio Cal. m. dia 3.545 - 38.5 Cole. tub. 670
Calor. 8.300 - 39. (Observe esta
reabertura de -

O coc. 2 apresenta na parte
superior de membro anterior dorso
frente à apila um tumor de
volume d'um punho, indolente
sem rubefacção e fluctuante.
Do punção aspiradora foi
retirada assericamente uma
certa porção d'um líquido
rosco-purulento com o qual foram
feitas preparações e cult. em caldo
e injectada no peritônio numa
cubeta - O exame microscópico

157

resolou apenas a presença de
glóbulos de pus e ausência
de microbios.
— Morreu orate 68 dias
muculada a 25-V-01. Não
havia bubo — havia um
exudato pleural — Base de
aspecto normal — Foram feitas
pastes com o tecido de parte de
microscopia e com o baço. Não
preparações foram encontradas bacilos
da peste — Foram feitas culturas
com um exudato peritoneal líquido
recolhido por punção antes da
autopsia com o baço e com
o exudato pleural —
Exame a olho nu e microscópico —
Contagem específica de *Coccid.*
de cor de Coccid. examinada em
Mimos.

Sangue de Anna Ribeiro (peste) Belle Horizonte	
Lymphocytes	1
$\frac{P^{100}}$ mononuclears	53
Polynuclears	45
Eosinophils	6
	105

Sangue de Bocica Anna Leite Lagoa	
Lymphocytes	13
$\frac{P^{100}}$ mononuclears	21
Polynuclears	73
Eosinophils	11
Formas de transição	5
	123

Sangue de Bocica Anna Ribeiro Belle Horizonte	
Lymphocytes	36
$\frac{P^{100}}$ mononuclears	19
Polynuclears	56
Eosinophils	5
	116

Temper de baba de slupie - 4 Lagoa

Lymphocytes 17

P^o mononuclears 10

Polyuclears 70

Eosinophils 3

100

Temper de baba de slupie 7 Lagoa

Lymphocytes 12

P^o mononuclears 23

Polyuclears 93

128

29 de Maio Cab. inj. slo. 515. 38°. Cab. tub. 660
Cab. 8.800. 39.5.

Morreu a cobra 150. Foi
feita autopsia e com
exsudato peritoneal foi
muculada sob a pelle nua
- 152 - outra cobra - 152

30 de Maio Morreu e foi muculada com 7^o dose
Colhida de vacina - foi feita autopsia e dissecada
Anaphils em
Paraguay. 110-196

31 de Maio Cab. inj. slo. 548. 38.5. Cab. tub. 675
Cab. inj. slo. 8.200. 39.1.

1 de Junho Cab. inj. slo. 3.536. 37.7. Cab. tub. 655
Cab. 8.500. 39.1.

Morreu a cobra 152. Foi feita autopsia e com exsudato peritoneal foi muculada sob a pelle nua - 153

Foi injectada uma cobra com um escarro tuberculoso

2 de Junho Cab. inj. slo. 3.555. 37.1. Cab. tub. A. 644 (contig.) B. 382. Cab. 8.900. 39.9

3 de Junho Cab. inj. slo. 540. 38.6. Cab. tub. A. 660 - B. 385. Cab. 8.500. 38.7.

4 de Junho Cab. inj. slo. 3.562. 38.2. Cab. tub. A. 678 B. 400
Cab. 8.600. 39.

5 de Junho Cab. inj. slo. 3.535. 38.5. Cab. tub. A. 665 B. 395
Cab. 8.200. 39.

6 de Junho. Cab. inj. ales. 570. 38.1. Cab. tub. A. 695.
B. 405. Cabra. 8,500. 38.8.

7 de Junho. Cab. ales. 560. 38. Cab. tub. A 685.
B. 418. Cabra. 8,300. 39.0.

8 de Junho. Cab. inj. ales. 540. 37.8. Cab. tub. A 670.
B. 405. Cabra. 8,500. 39.5.
A cabra recebeu novamente
sob a pelle alas de fígado de
bacalhão estive na dose de .5cc.
— Foi novamente injectada no
ventro com 2cc de sangue normal
de caralho e cab. em preparação p.
produção de soro hemolytico.

9 de Junho. Cab. inj. ales. 3. 570gr. 38.
Cab. tub. A 698. B. 427.

Colheita de *Anopheles*
em Sarapuí. Foi preparada a car. 9 em 4 litros.
com Sarapuí. Foi preparada a car. 8 em 4 litros.
de fígado de bacalhão estive na dose de .5cc.

~~Os resultados da reação de aglutinação
com o sangue de caralho e cab. em preparação
são os seguintes: com 2cc de sangue
de caralho (car. normal).~~

10 de Junho. Cab. inj. com ales. 542. 38.4.
Cabra 8,500. 39.8. Cab. tub. A. 650. B. 407.

11 de Junho. Cab. inj. ales. 548. 38.3.
Cab. tub. 3. 677. 4. 437.
Cabra. 8,700. 39.5.

Foi examinada sangue d'uma
pomba de Laboratório e reconheci-
do a presença de *Halleridium*
Damilevsky.

Foi preparada anatomicamente uma
garcia afim de recolher-se um
soro p. estuda de desensibilização
de *Halleridium*.

12 de Junho. Cab. inj. ales. 3. 550. 38. Cab. tub. A. 450gr.
B. 690. Cabra. 8,500. 39.
Foi preparada uma sal. de chloro.

de sódio a 0,6% e esterilizada
no autoclave -

13 de Junho Cab. inj. elev. - 545. 38.5 - Cab. tub. 677r.
427 - Cabra - 900gr. 39.3
- Injeção de cor. 1.5 com 13cc
2.ª injeção de 2.ª de pele em
16cc d'água - Foi acompanhado
e desenvolvimento de bacteridum
em sotta prazente n'm
líquido formado de

Na Cl a 0,6% - 9

Soro de gaur - 1

Foram feitos os seguintes estudos:

Sabida dos flaculos, formação
de corpos esfericos, emissão
de flaculos e libertação destes -

14 de Junho Cab. inj. elev. 530. 38. Cab. tub.
3. 425. 4. 656. Cabra. 9. 102. 39.3
Exame de microscopia (clorof) de
Anopheles -

Foram injectados os seguintes

154

Cab. - Pse 245 - Temp. 38.3 Injeção
na peritonéu com cult. em caldo
de peito - Sente baço cab + a 4.11
- Rato branco Pse 65gr. Injeção
com peste - na peritonéu

15 de Junho Cab. inj. elev. - Cabra
Cab. tuberc.

16 de Junho Cab. inj. elev. 570. 37.8 Cab. tub. 745 -
4. 455. Cabra. 9000. 39.

17 de Junho Cab. inj. elev. 570. 38.5.
Cab. tuberc. 3. 675. 4. 450
Cabra - 9000. 39.

Foram encontrados mortos a
cabeça e a rate injectada a 14.11
Foram feitos os seguintes exames
e com o exudate peritonéu de
cab. foi injectada n'm
Cabra. - Pse 310. Temp. 39. In sob a pelle
e com o exudate de rate o
Rato - 62gr. sob a pelle

155

25 de Junho Cab. inj. oleo - 570 - 38.3 Cab. inj. tuberculose
3.662. 4.432 - Cabra inj. oleo - 38.5
Mouca - pele maculada com 0,5
de soro de S. Paulo e pele - Foi feita
a autopsia -

26 de Junho Cab. inj. oleo - 3.565 - 38.2.
Cab. tuberc. 3.705. 4.425
Cabra de 9.300. 38.5.
157 - Foi injectada sob a pelle
com um escarvo m^{te} rico em
bacillos, numa cabra de
168 fr⁵ - Delle foi feita mancha
mista na cabeça e no flanco esquerdo
numa t^{ma} t^{ma} da m^{ma} cor.
- Foi injectada com uma
simpla picada no peritoneo
com este branco de 81 fr.

27 de Junho Cab. inj. oleo - 3.580. 37.7.
Cab. tuberc. 3.715 4.440. 5-170
Cabra inj. oleo - 9.500 - 38.5 -
Foi comprada na pigulor m^{ma}

cabra enviada pela S. Miguel Couto
onde utraides 220cc de sangue
A cabra pesa - 17^{kg} 700

28 de Junho - Cab. inj. oleo - 580 - 37.5 -
Cab. tub. 3.705. 4.435 - 5-170.
Cabra - inj. oleo - 9.500 - 39.1
- Foi transcorada e soro da
cabra recolhido e 110cc com
soro anemmetizado e turve
Foi colhido cada na est^{da} 37.

29 de Junho Cab. inj. oleo - 595 - 38.8
Cab. tuberc. 3.720. 4.440. 5-180
Cabra inj. oleo - 10k. 38.7

30 de Junho Cab. inj. oleo - 568. 39.3
Cab. tuberc. 3.698. 4.432. 5-192
Cabra - inj. oleo - 9.500. 39.4

1 de Julho Cab. inj. oleo - 595. 38.6
Cab. tuberc. 3.720. 4.460. 5-195
Cabra - 9.600 - 39.5 -
Foi purificada cult. de diphteria
Foi transcorada e soroado e

O soro da cobra de 1º de Jul. Cont.
 Foi novamente injectada em
 dose de sangue normal de cobra
 a cobra utilizada p.^a e preparada de
 soro hemolytico.

2º de Julho. Cob. inj. des. 3.580p. 38.2
 Cob. tub. 3.715. 4.450. 5.200p.
 Cobra inj. des. 9.100. 39°.

Foi inj. rote com For sanfrade e cor. 5. em 4 litros
 Verde, no perito. Morreu e foi autopsiada im-
 rato. /

3º de Julho. Cob. inj. des. 3.585. 38.2. Cob. tub. 3.725.
 4.445. 5.198. Cobra 9.800. 39°
 Foi sangrada artificialmente
 com a cobra de 720p. e os hemis-
 sangue da pupila externa e da
 carótida.

Foi sangrada a cobra de 1º de Jul. Cont.
 Filtragem de cultura Martin.
 Foi recolhida gorbura d'uma
 cubia sendo livrada as antídotos.

4º de Julho. Cob. inj. des. 576. 38.3.
 Cob. tub. 3738. 38.3. 4.785.
 5.439. Cobra 9.500. 39.1.
 Foi injectada e cal. 14.
 Foi sangrada e soro
 Foi filtrado e cultura de
 6 dias de diptheria em
 calde Martin.

5º de Julho. Cob. inj. des. 528. 37.8.
 Cob. tub. 3.680. 4.200. 5.460.
 Cobra. 9.700. 39.2.

Foi injectada e cor. 2.

Foi purificada cult. de diptheria.
 Morreu e rote injectado com 0.12
 de soro de S. Paulo. S. antyph.
 revelou não ter o animal
 morrido de peste.

Foram injectados com toxina
 diptherica as 2ªs cobaias.

158. Cob. 1. Fuchsina na calce.
 Pellos amarelados, pretos e amarellos

distubuidas confusamente pelo
corpo, havendo apenas predomina-
do de amarello na fronte e na proco-
e d'umta Injeccao com $\frac{1}{50}$ cc de
toxina -

159

^{Pro. 373}
Col. 2. Tachina na fronte. Pellos
arripiados amarells, brancos e pretos.
Amarells na $\frac{2}{3}$ posteriores do corpo,
incluindo e membra post. expando
e a exapca de d'umta f. brancos. Linha
arcuolar branca ao nivel do pescoço.
Mancha preta comprehendendo as 2 orelhas
e o olho direito. Mancha amarella arreda
de olho esquerdo e mancha branca na fronte.
Injeccao com $\frac{1}{10}$ cc de toxina.

160

Col. 3. Violleta na cabeça. 253. 373.
Pello arripiado preto e amarells. Pello em
quasi toda o corpo menor na latera esquerda
do pescoço. pie é amarello mancha amarella
na fingeira preta e na f. a parte posterior
direita Injeccao com 0,5 de toxina.

6 de julho

Col. inj. ola. 570. 388.
Col. tuberc. 3725. 11. 440. 5. 212.
Cabra. 9900. 39.2

Morreu o rato maculado com pellos
na fronteira a 2 VII - Por pellos
autopsia - Semagur com abaco. Co-
o expando posterior f. maculado
de a pelle num outro rato.

7 de julho

Col. inj. ola. 557. 38.4
Col. tub. 3.710. 11. 402. 5. 212.
Cabra. 9900. 38.6

8 de julho

Col. inj. ola. 3.550. 38.
Col. tuberc. 3.680. 11. 420. 5. 207.
Cabra inj. ola. 9000. 38.9.

Form. injeccadas com 2cc de oleo de
C. Gode de Amadcan e ter. liado
a col. ja injet. n. 3 e a inj. t. d. l.

161

Col. Pro. 4900. - Pello e mitta, pellos arripiados
Mancha mitta na olha da cabeça, pellos arripiados
e orelha de latera esquerda e latera direita de pescoço.
Mancha mitta na metade superior do abdome.

124)

BL 15 000 00. PI. TP. 57. I. f. 63. V

e parte posterior exposta. O resto do corpo
molhado de prote e creiro.

Foi encontrada morta a
calhain n° 158 injectado a 6-1/11 com
1/50 de toxina diphtheriae. A 1.5 de
tarde inoculou a cel. n° 159
injectado com 1/10 da toxina. A
cultura revelou intensa multiplicação
e disseminação no ponto de inoculação
constatou enorme per exemplares
supra e infra de embolismos e meningites
de cel. 166 após 39.4 F.

Foi inoculada a cel. 9 com 1/10 de
embolismos e a 1.16. (pela via eubria)

9 de julho. Cel. inj. alv. 3.560-39.8. 4.455-39.5
Cel. tub. 3.677-4.430-5.212.
Cebra inj. alv. 10k. 39°.

Foi distribuída a soro da 5 após
aproximadamente de 1 hora a 56°C.

Foi remaneado em caldo para
de cel. 2 (4 cont.) 1 par de embolismos (1 par)

BL 15 000 00. PI. TP. 57. I. f. 64

725-

10 de julho. Cel. inj. alv. 3.540-39.5. 4.475-38.5

1.1. a tub. Cel. tub. 3.655-4.448-5.222

de Martin. Cel. inj. alv. 9.700-38.5.

Cyrene. Cel. inj. 1/10 tox. diphtheriae 290. 38.5

Foi filtrado o cultivo de
diphtheria em caldo de Martin.

11 de julho. Cel. inj. alv. 3.565-39.3. 4.450-38.2

Cel. tub. 3.690-4.440-5.230

Cel. inj. toxina diphtheriae 290. 38.5

Cebra inj. alv. 9.100-38.4.

Foi separado o cor. 8.

Foi preparado o soro de Bonel.

12 de julho. Cel. inj. com alv. 3.540-38.3. 4.470-38.5

Cel. tub. 3.690-4.450-5.222

Cel. inj. com 1/10 de toxina diph. 295. 38.4

Cebra alv. 1-10k? 38.5.

13 de julho. Cel. inj. alv. 3.542-39. 4.472-38.9. Cel.

tub. 3.690-4.444-5.220. Cel. tox. diph. 302.3.

Cebra alv. 10.200-38.8.

Transvasamento de soro. Foi inoculada

Na ponta de miculagem da ab. alba 3
(antiga) formou-se um absciss. pr. na
data de hoje rompiu-se dando subsíd.
a um plus cremoso. - Na ab.
n.º 4 (nova) formou-se também um
empolamento e pela ponta de
miculagem sahe um líquido
sore purulento com cheiro de alho.

— Morreu a ab. miculada miculada
na periboneca com peste a 13-VII-01
com o exudate purulento foi
miculada.

Reite - 125 gr. miculada sahe a pelle
com exudate de periboneca pastosa.

— Foi feita a reacção de Vital
com o sore d'um *Hyphocia* recolhido
na 14.ª dia de incubação. - A agglutina-
ção foi patente até 1:100 não sendo
homogeneizada a diluição máxima
por falta de soro.

17 de Julho - Cal. alba 538. 38.4. 2 462. 38.6
Cal. tuba. 3 412. 4. 455. 5. 218.

Cal. alba 10.150. 38.6

A ab. l. deo apresentava a ponta
de miculagem como absciss. pela
qual para hermia em o espaço de
carnície, pr. foi absciss. com um
plus. (ver. de) pr. com a constituição pr. m.
de fora parde. Tinha pelo com um
corpo mortuário a constituir-se
de miculagem tendo enfeitado e gottado
alho e pr. pr. miculada pela acide. em
a pr. pr. fixada na l. de Heming.
Foi impediado o cor. de J.

18 de

18 de Julho - Cal. alba 3.568. 4. 500. 38.8. Cal. tub. 3 425.
4. 437. 5. 237. Cal. top. 320. 38.0
Cal. alba 10.500. 39.0

Foi retirado asepticamente um
plus e com o soro de ab. l. deo
(cal. n.º 4) e com o plus e a palpa
foram feitas culturas em lâminas.

Soro e agar glicerinado

19 de Julho. Cab. aleo. 3.525. 38.8. 4.485. 39.3.

Cab. tuberc. 3.725. 4.440. 5.230.

Cabra aleo. 11.000. 38.8. Cab. tuberc. 307. 38.5.

Foi corada pela presença de *Sanerum* em uma peça de salabimbo.
 Solante de 19-4-01 durante 1 hora
 onde o resultado satisfatório no
 se refere a coloração da chromatin.

Foiem feito novas sementinhas com
 os ganglios tuberculosos.

20 de Julho. Cab. inj. aleo. 3.525. 38.4. 4.490. 38.5.

Cab. tuberc. 3.715. 4.445. 5.245.

Cabra i com aleo. 10.700 - 38.8.

21 de Julho. Cab. inj. aleo. 3.545. 36.8. 4.496. 39.3.

Cab. tuberc. 3.733. 4.417. 5.221.

Cabra 10.800. 38.5.

22 de Julho. Cab. inj. aleo. 3.524. 38.5. 4.470. 38.7.

Cab. tuberc. 3.700. 4.400. 5.230.

Cabra inj. aleo. 10.600. 38.8.

O ponto de inoculação da cab. 4.400. aleo.

Foi Sempado e co. 11.

Foi sacrificado e autopsado o rato min.
 lado dele a pelle alle 8.11. Não foram
 encontradas as lesões da peste.

Foi feita sementinha com uma
 cultura de peste detendo após 48
 inclinação detendo de 28-8-99.
 preparações feitas com essa cultura
 mostravam massas com forma de
 da e ausência de microbios.

Foi injectado novamente a
 caber aleo com 12 cc de aleo sobre
 a pelle do abdomen. O líquido
 espalhou-se em forma salinica
 no ponto de inoculação.

Com *Coxsackia biphterica* (cultura de
 5 dias) foram injectados os seguintes.

Cab. 340gr. 38°C. *Fuchsiana* na cabeça.
 Pelle lisa. Dente branco e viva.
 Cravado de lado direito e movido
 bruto de lado esquerdo de focinho.

163 -

Mancha branca na fente posterior, prolongando-se de lado a parte no respectivo quarto. Mancha preta no dorso. O resto do corpo e mandíbulas de preto e ruivo. Inj. com $\frac{1}{10}$ cc de toxina dift. Bz 320. 38.1 Tracheina no traqueia.

164-

Delle amputado. Pata, branca e ruiva. Focinho branco. Mancha amarelle sobre o olho direito e preto sobre o esquerdo. Mancha branca na culatra. Mancha preta no porcoço. O resto do corpo ruivo. Inj. com $\frac{1}{50}$ cc de toxina.

165-

310r. 38.7. Tracheina na cabeça. Branca preta e ruiva. Delle lise. Mancha branca no alto do focinho, cabeça preta. Mancha branca no dorso prolongando-se às partes anteriores. Mancha preta no quarto posterior, exposto e ruivo no quarto posterior, exposto e ruivo no quarto posterior direito. Pata, preta, também branca. Pequena mancha ruiva sobre o olho direito. $\frac{1}{100}$ cc de toxina dift. Bz 310r. 38.7.

23 de Julho. Cabe. inj. de 3.520. 38.8. H. 49r. 38.5.

Cabe. tot. 3.795. H. 1155. 5.230.

Cabe. de. 1100r. 110.3.

A cabeça apresenta extensa edema dura de toda a parte abdominal correspondente ao ponto de inoculação. Foi encaixado e sóio da 5.ª série e injectado nos apt. cobaios.

166

Tracheina na cabeça. Bz 289. 40. Delle amputado. Pata e ruiva. Mancha ruiva na metade esquerda do abdome. Tracheina sobre a pelle do abdome com:

0.5 de soro de cur. 5

0.5 de soro em H₂O de leubr. de 24h; em gar.

167

Tracheina no traqueia. 310r. 39.8.

Delle amputado. preta e ruiva. mandíbulas, ruiva no traqueia e na fente anterior, exposto.

0.2 de soro da 5

0.5 de soro em cultura

H₂O q.b. p. 1cc.

168 - Violeta na cabeça. Dn. 220. Temp. 40
 Testem. Pelle arrugada, preta e unia mesclada.
 0^{as} de cultura.

24 de julho - Cab. inj. oleo - 3.530. 39. 4. 500. 38.6
 Cab. tub. 3.705. 4. 460. 5. 250.
 Cale. tox. dipht. 1.340. 39.5. 2.330. 39.3
 3. 315. 39.3. Cabra oleo 10.400. 40.2.

Cab. 169-176 - Foi conseguido e estado da após se
 aqueceu (Caverna Vasconellos.)

25 de julho - Cab. oleo - 3.555. 38. 1. 4. 415. 38.
 Cab. tub. 3.665. 4. 455. 5. 255.
 Cab. tox. dipht. 1.335. 40.3. 2.335. 38.7
 3. 325. 39. Cabra oleo - 10.600. 38.9.

26 de julho - Cab. inj. oleo - 3.532. 38.5. 4. 475. 38.5
 Cab. tub. 3.675. 4. 440. 5. 240.
 Cale. inj. tox. dipht. 1.310. 39.5. 2.315. 39.
 3. 320. 38.5. Cabra - 10.900. 38.8.

Morte e autopsia de cab. injectada
 com peste a ! Peractinobulb.
 e sangue para cultura.

27 de julho - Cab. inj. oleo - 3.530. 38.3. 4. 490. 38.5
 Cab. tub. 3.690. 4. 435. 5. 520.
 Cale. tox. dipht. 1.310. 39. 2. 320. 39.
 3. 320. 39.2. Cabra oleo - 11.000. 39.3.

28 de julho - Cab. inj. oleo - 3.550. 38.5. 4. 490. 38.8.
 Cab. tub. 3.728. 4. 450. 5. 252. Cab. inj.
 tox. 1.322. 39.2. 2. 345. 38.4. 3. 325. 39.5
 Cabra - 11.000. 38.9.

29 de julho - Cab. inj. oleo - 3.550. 39. 4. 1185. 38.5.
 Cale. tub. 3.710. 4. 430. 5. 255. Cab. inj.
 tox. dipht. 1.320. 38.5. 2. 340. 38.4. 3. 325. 38.7
 Cabra oleo - 10.200. 38.7.

Foi injectada sob a pelle com um
 cult. de peste a ref. cabai.

171
 Dn. 220. 38.7. Peste e unia. Murcha
 unia no alto da cabeça e ao redor do
 pescoço. Dn. de corpo preto. Pelle arrugada.
 Foi verificada e pronta de fusão
 de cera virgem ou se acha natural
 entre 62 e 64°C. Foram feitas misturas
 de cera e oleo de figado de bacalhão.

onde estubado os pontos de fusão de
um.

Cela 1. de 100 - não solidificou-se

Cela 2. de 100. consistência de melaça

Cela 3. de 100 solidificou-se de fusão de 11.400

Temp. ambiente 20°C

30 de julho Cel. de - 1.550. 38.6. 2. 495. 38.5

Cel. tub. 3. 687. 4. 459. 5. 257.

Cel. tox. digest. 1. 320. 38.7. 2. 329. 38.2. 3. 314

38.1. Cebra - 11.200. 38.9.

A cel. inoculada com 0.2 de soro e

parte a - 23-7-01 apresentou suppuracão

com gametas oncosfite. Com a p. p.

para pasta preparado breiter e não

unclaram em relação as bac. da pasta

Foram p. s. rementidos e inoculada

na p. s. com a cel. -

31 de julho - Cel. de 3. 545. 38.3. 4. 520. 38.5. Cel. tub. 3

685. 4. 460. 5. 270. Cel. tox. digest. 1. 320. 38.8.

2. 340. 39. 3. 330. 38.7. Cebra - 11.200. 39.5.

Explosão na p. p.
de novo batido

1 de Agosto - Cel. inj. de 3. 520. 38.5. 4. 510. 38.3

Cel. tub. 3. 675. 4. 450. 5. 280.

Cebra inj. de 11.000. 39.7.

Foi estubado a Kema Leger

de pontos

2 de Agosto - Cel. inj. de 3. 520. 38.8. 4. 510. 38.7

Cel. tub. 3. 665. 4. 470. 5. 260.

Cebra de 11.400. 39.3.

Morreu a cel. Teste em p. s.

inoculada a 23 de julho - Foram

p. s. cultivos -

3 de Agosto - Cel. de 3. 520. 38.7. 4. 515. 38.

Cel. tub. 3. 670. 4. 465. 5. 260.

Cebra de 11.300. 38.7.

Morreu a cel. inoculada na

p. s. com a p. s. - 30-7-01 com p. s. da

cel. inoc. com 0.2 de soro - O soro

reco e microscopia revelam a

presença de bac. da pasta - semelha

de exudate e de lago

4 de Agosto Cel. de 3. 569. 38.4. 4. 528. 38.7

Cal. tub. 3.72 4.486 5.280.

Calra alio. 11.500 39.1

5 de Agosto - Cal. alio. 3.510 38.5 4.525 38.

Cal. tub. 3.685 4.490 5.280

Calra alio. 11.400 39.5

Mom a calain impetudo con
pote a 29-7-01. Foi um finto
entropia e consuetudo

6 de Agosto - Cal. alio. 3.565 38.7 4.530 38.5

Cal. tub. 3.715 4.435 5.230

Calra alio. 11.300 39

7 de Agosto - Cal. inj. alio. 3.555 38.8 4.530 37.8

Cal. tub. 3.700 4.475 5.285

Calra alio. 11.400 38.8

A calra alio. foi impetudo Cal
elle com tce d'uma saluam
de cera e oleo pa 2%.

Foi um abito de lillas preparau
de hematoxocarum (homem apombo)
pale method de Loxerum

8 de Agosto - Cal. alio. 3.510 38.5 4.455 38.2

Cal. 3.525 38.5 4.455 38.2
manaria directa

Cal. tub. 3.620 4.480 5.305

Calra alio. 11.600 39.5 Empatamali
no posto de imulacae

9 de Agosto - Cal. alio. 3.555 38.3 4.505 37.8

Cal. tub. 3.665 4.460 5.300

Calra alio. 11.300 39.3 Empatamali
dura e dilogo de repa de repa

10 de Agosto - Cal. inj. alio. 3.560 38.8 4.540 38.5

Cal. tub. 3.695 4.480 5.300

Calra alio. 11.800 39

173

Foi impetudo no posto com
uma catina de pote de fapir de
cal + a 2-VIII-01 uma calra
de 355 38.9

11 de Agosto - Cal. alio. 3.565 38.2 4.550 37.8 Cal. tub.

3.700 4.485 5.320 Calra alio. 11.600 39

12 de Agosto - Cal. alio. 3.560 38.5 4.560 38 Cal. tub.

14 de Agosto - Cal. alio. 3.685 38.5 4.490 5.300 Calra 11.700 39

13 de Agosto Cab. des - 1.551.38.4 2.578.38.4. Cab. tub.
4.313.5.489. 3.701. Calva des. 12 k. 39.6.

14 de Agosto - Cab. des. 3.575.38.7. 4.535.38.5
Cab. tub. 3.725. 4.490. 5.320.
Calva des. 11.800. 39.3.

Sargento de 8 -
Inoculação de -
13 - foi sacrificada a cab. inj. no
peritônio a 10-8. Com a epididimo por
falta de semente e inoculada sob a pele
de abdomen uma cabala.

15 de Agosto Cab. des. 3.569.38.1 4.542.38.2
Cab. tub. 3.735. 4.325. 5.482.
Calva des. 11.700. 38.7.

16 de Agosto Cab. des. 3.575.38.9. 4.580.38.5.
Cab. tub. 3.735. 4.480. 5.320.
Calva. 12k. 39°

17 de Agosto Cab. des. 3.556.38.6 4.528.38.1
Cab. tub. 3.693. 4.353. 5.510.
Calva. 12k. 40.2

Forma repetidos os cult. de tuberculose

174

que desenvolviu-se apenas em 1 dia
tubo de bacilata remota - 27-VIII -
O cor. 2 apresentou uma tumefacção
d'um simples axilla - 5 por puncção
rende sangue e conteúdo no peritônio
d'uma cabala.

18 de Agosto Cab. des. 3.555.38.8. 4.535.38.8.
Cab. tub. 3.735. 4.490. 5.325.
Calva des. 12k. 39°

19 de Agosto Cab. des. 3.550.39. 4.520.38.8.
Cab. tub. 3.730. 4.480. 5.325.
Calva des. 10.700. 39°

Foi inoculada no peritônio com
uma cultura de forte de 48h.
os repto animas.

Plato branco - Br. 165gr. 1/4 cc
Cabala. 360gr. 39°

Comegou a a renfisar a região
curativa de Soro de cor. 8
para o que se a reparte
uma de cabala que todos

175

reculorum intra 3 et 4 h. oct. sale
a pelle de abdomen 2^o 5 d'anna
cultura de parte de 48 h. Das
colores 1 xirada se testemuka,
2 xirai beatada pele vira anti pilos
e 2 outra pele vira normal.

Serie. (Enxai pedol cordão)

176 Calc. 1 - 492 gr. 39° 2. Trichina na
cabeça. (Testemuka) -

Delle arripado. Preta e branca
Mancha branca ne facie e
altre esprede que se prolonga
a parte inferior de peço e
abdomen. O resto do corpo preto

177 Calc. 2 - 549 - 39° 4 Trichina ne trozo.

Delle arripado. Preta naia e
marcada. Pequena mancha preta
ne facie.

178 Calc. 3 - 485 - 39° 5. Violeta ne cabeça

Delle arripado. Branca, preta e
vira. Mancha preta ne costas

que se propaga a parte inferior grande
Mancha vira sobre e altre esprede

O resto do corpo branco

179 Calc. 4 - 445 gr. 39°. Violeta ne trozo

Delle arripado. Branca, branca e
preta. Mancha branca ne facie
e fronte post. direita. Mancha
preta ne altre esprede. O resto do
corpo vira.

Calc. 5 - 435 gr. 38.8. Violeta ne costas

Delle Lisa. Branca preta e vira
Mancha preta ne cabeça. Mancha
vira na outra esprede. Molate
superior do corpo vira ne lado
direito, preto ne esprede. Trozo
e fronte Branco.

Calc. 6 - 3.565 - 38.4 - 4.545 - 38.5

Calc. 7 - 3.710 - 4.500 - 5.335

Calor ali - 12.200 - 39 -

Tomou a temperatura e mptu
vira de repente mais -

Série série cor. 8 -

Col. 1. Determinada - Temp 39.6

Col. 2. Inj. com 1cc soro de 8. 39.3

Col. 3. Inj. com 1cc de soro normal. 39.

Col. 4. Inj. 1cc soro 8 - 37.9

Col. 5. Inj. 1cc soro normal 38.8

Estado moribundo por
sacrificando e com injeção no
peritônio a 19-VIII-01 e pútr
cultura com o exsudato

21 de Agosto Col. inj. soro 3.540. 38.4 4.530 38.5
Col. tub. 3.720. 4.480. 5.325 Cebra d. 12.200 39.2

Série soro 8

Col. 1. Test. 38.

Col. 2. 18 recém nascidos soro 8 38.2

Col. 3. Inj. " " " " normal 39.5

Col. 4. S.d. " " " " 8 37.7

Col. 5. Inj. " " " " normal 39.0

Estado moribundo e com inj. no
peritônio por sacrificando e com o
exsudato peritonial semeado Follen

179

de calor e injeção soro a pele
uma caloria -

22 de Agosto - Col. soro 3.565. 39.4 38.8

Col. tub. 3.715. 4.485 5.335

Cebra soro 12.500 38.8

Série de Soro 8

Col. 1. 38.5 (Determinada)

Col. 2. 38.4 recém + 1cc S. 8

Col. 3. 39.0 " " 1cc S. 8

Col. 4. 38.4 " " 1cc S. 8

Col. 5. 38.7 " " 1cc S. n.

23 de Agosto - Col. soro 3.545. 38.5 4.485 38.8

Col. tub. 3.695. 4.485 5.340

Cebra soro 13k 39

Série soro 8

Col. 1 - 39. Determinada

Col. 2 - 37.9 recém + 1cc S. 8

Col. 3 - 39.1 " " S. n

Col. 4 - 38.5 " " S. 8

Col. 5 - 39 " " S. n.

Série São S

Colo 1	Testam. 39.4
Colo 2	38.1 + 1cc S. 8
3	39.5 + 1cc S. n.
4	38.3 + 1cc S. 8
5	39.4 + 1cc S. n.

28 de Agosto

Calor inf. clo. 3.590. 38.5. 4.545. 38.3
 Calor tub. 3.730. 4.500. 5.345. Calor mina tub. 200.
 Calor clo. 12.500. 38.8.

Série São S

1	38.7	Testam. 38.7
2	38.2	1 ^a São S 38.2
3	39.3	1 ^a S. n.
4	38.0	1 ^a São S
5	39.7	1 ^a S. n.

- Foi filtrada uma cultura de peste
 p^{ta} a 23-8-01. em calor Martin com
 o fim de verificar a presença da toxina.
 Aprox. filtrada por o papel colado na tampa.

29 de Agosto. Calor clo. 3.595. 38.7. 4.570. 38.2
 Calor tub. 3.735. 4.595. 5.360. Cal.
 mina. mina sup. 205.
 Calor clo. 13.4. 38.8.

Série São S-

1.	Testam.	Amarela morta
2.	S. n.	37.7 Erub. para o tempo
3.	S. n.	37.1. " " flumina
4.	S. n.	37.5 " " seffund
5.	S. n.	39.4 " " Com

Não foram injectadas com Soro
 A autopsia de testam. revela
 todos os legos característicos da
 peste. ^{face} Havia no ponto de
 inculcação e creche espessa
 supuração de volume e hemorragia
 dos ganglios. Visceratos numerosos
 de legos. Alguns ne p^{ta} de
 Pulmões extremamente congestos com
 granulacões. Exsudato peritoneal
 e pleural. Com o fuso e

com e bulbos fazem parte cultivos.
 As culturas de tuberculos - feitas
 ha 12 dias e deixadas em estufa
 a 37° apresentam-se prazantes.
 (cult. em batatas).

30 de Agosto - Cab. des. 3. 585. 38.6 A. 535. 38.5
 Cab. tub. 3. 745. 4. 490. 5. 350. Cab. min. 210g.
 Cabra des. 13k? 38.8.

— Sêrie de Sêrie 8 —

Cab. 2. — 38.1. S.8. us. pr. optim

Cab. 3. morosa is 24.30 t.

Cab. 4. — 37.2 S.8. us. pr. bon

Cab. 5. 39.4. Sn. us. pr. offrend

A autopsia da cab. 3 revelou a
 presença de todos os leões característicos
 com as partes obnubias. O bago
 apresentava-se enorme extraordin.
 novamente diferente e apresentando
 enorme e numerosos tuberculos.
 Os pulmões apresentavam-se
 com focos de pneumonia e

granulações que eram bastante
 encarnadas e pegadas. Enorme
 foco de necrose no ponto de inserção
 da língua e ganglios linfáticos muito
 aumentados de volume e compactos.
 Foram feitas culturas e
 cultivos — de propagação
 sem resultados negativos.

31 de Agosto - Cab. des. 3. 600. 38.3. A. 550. 38.5
 Cab. tub. 3. 725. 4. 505. 5. 345. Cab. min. 220g.
 Cabra des. 13.30v. 39.

— Sêrie de Sêrie 8 —

Cab. 2. S.8. 38.2. Estado geral optim

Cab. 4. S.8. 39.2. " " bon

Cab. 5. Sn. 39.1. " " offrend

Inspeções com Tcc nos respectivos pa

181

Com uma cult. impura obtida de
 cab. 3 morta a 3k foi inoculada na
 a pelle de uma cabra de 25 kg.

1 de Setembro - Cab. elo. 8 - bvp. 31.4. H. 545. 38.9

Cab. tale 3-703. 4-520. 5-373

Cabra elo. 13.500. 38.5.

Monen a cab. 185 injectado a 31

Não foram encontrados C. as de pte

Monen a cab. 185 injectado a 31

2 de Setembro

Levi S. P.

2. S. P. 38.

4. S. P. 37.

5. Sn. 38.9.

2 de Setembro - Cab. elo. 3. 605. 38. H. 540. 38.3.

Cab. tale 3750 4505 5360. Cab. min 240

Cabra elo. 13.500. 39°

Levi S. P.

Cab. 2. S. P. 38. + 1cc. S. P.

Cab. 4. S. P. 37.1 + 1cc. S. P.

Cab. 5. Sn. 38.9. + 1cc. S. P.

A cab. 4 (S. P.) foi apresentada
adotada e dispostos melhor
seminalmente, tomando-se agosto
e sendo comido todo o alimento

existente na gaita de pte
e cab. 5 (Sn.) que apresentava a bvp
disposta (talvez por distensão) apresentava
bvp mte pte - fortemente dyspnoica
nem tanto prona alimentada, mte
dos movimentos - A cab. 2 (S. P.)

desmora por um grande enfisema
uma parte de tecido necrosado
sob a forma duma massa
amarelada. Em a cab. 4
amim como a cab. 4 (S. P.) apresenta
enorme ganglios infimias convergentes
to a pte de inalação.

Cum uma a outora pte
de pte da pte distal da
Cab. 1 (S. P.) S. P. 8 foi injectado
no puncto de inalação -

Foi injectado sal e sile
de pte a cab. elo. com 3cc
a uma solução atil de cera em
alo de fide de bacalhau a 2%.

182

Ascaris obtusus com - calcifo
a 18-01 não envermearam
murcha da pele - Poucos
de constrição pele calí -

- Preparo de batatas.

- ~~Cães q foram de morte~~
Elasora -

- Foi injectada com mais
20cc de sangue de caradde na
peritoneu a colónia que já tem sido
injectada -

3 de Setembro Cal. elev. 3.000 38.3 4 525 38.1
Cal. elev. 3.700 4 495 5 365
Cal. min. 256 Cal. elev. 1320 39.5
Linha só 8.

Col. 2 38.2 + 1cc. S.S.

Col. 4 39.4 + 1cc S.S.

Col. 5 morreu a 18.30 da manhã
A autópsia da col. 5 revelou as
mais características larvas da

pele branca; um enorme lago
estendendo-se fraquel e crivado
de numerosos tuberculos de 1 a
2 mm de diametro. Exemplo
mprimas grandemente comprimentado
de volume tuberculos ne fijos
Exubate semitonsal - Pleurita com
adherencia e falsas membranas
Pneumonia dupla - Tuberculos
pequenos ne pulmões - 2^{da} pleura
de tecido mortificado ne ponto
de inoculação com transformacão
em puriforme - Todos
fictos cultivos com o bazo
e com um sangue inguinal -

- Foi ensaiada uma toxina
proviniente da filthagen duma
cultura de pele na estufa a 35°
durante de 5 dias - A toxina
fui injectada ne peritoneu de
rato brancos de este modo

1 Enxada da 1^a forma posterior

(Cult. em calde H.^m 5 dias na estufa a 35°)

Rato 1 - Enxada m. cab. 0,5 forma na peritonca

Rato 2 - Enxada m. cab. 0,2 " "

Rato 3 - Enxada m. cab. 0,1 " "

11 de Setembro Cal. obs. 3.555. 38.3. 4.535. 38.5

Cal. tub. 3.720. 4.495. 5.365. Cal. min. 245.

Cal. obs. 13.300. 39.3

Linha s. 8.

2. 38.2 4. 37.9

183

Foi injectada na peritonca uma
cabaia com uma cult. de fezes

5 de Setembro - Cal. obs. 3.615. 38.5. 4.550. 38.3

Cal. tub. 3.735. 4.515. 5.370. Cal. min. 260

Cal. obs. 13.100. 39°

- Linha s. 8.

Cal. 2. 38° + 1cc. de s.s.

Cal. 4. 38° + 1cc. de s.s.

Estudo geral exploratório

6 de Setembro Cal. obs. 3.600. 38.5. 4.420. 38.5

Cal. tub. 3.740. 4.490. 5.370. Cal. min. 260

Cal. obs. 13.420. 39

Linha s. 8.

Cal. 2. 38.0 + 1cc. s.s.

Cal. 4. 38.5. + 1cc. s.s.

Foi sacrificada a cob. inc. culada na
peritonca a 4.9.01. Com. exsultante
foram feitas culturas e inc. culada
na pelle do abdomen a

184

Cabaia a per. 19.01. tempo 38.8.

- Tendo examinada proporcionalmente a
cabaia d'um doente proveniente do
Nore. tendo verificado a existencia
de bellas "crescentes" na cade d'uma
accentuada eosinophilia.

Foi extirpada um escarro tuberculoso
(ver. microscop) sobre uma folha de
papel alvissimo secado na estufa a 35°
durante 24h. e expontado com
uma solucao corada de Gysala 5%
oti emulsa o papel - for. dessecat
e lido. durante 24h. findos os

guas e papel embuzado de coque
foi triturado com areia em um
calice de vidro com água plástica
para coar através um pouco
de algodão e líquido obtido injetado na
Cabeira - nota viva e molhada. 24/8.

185-

7 de Setembro Cab. dec. 3-600. 38°. 4-531-38.3
Cab. tub. 3-740. 4-520-5-375.
Cab. inj. col. col. 228. Cab. dec. 13-38.5.
Lini S. 8

Cab. 2.

Cab. 4

8 de Setembro Cab. dec. 3-600-375. 4-535-38.8
Cab. tub. 3-685. 4-495-5-365. Cab. inj. 275
Cab. col. col. 235. Cab. dec. 13.200-38.5.
Cab. S. 8.

Cab. 2 37.1

Cab. 4 37.4

9 de Setembro Cab. dec. 3-595. 38.8. 4-485. 38.
Cab. tub. 3-730. 4-490. 5-360. Cab. inj. 270.

Cab. tub. 235. Cab. dec. 13.300-38.5
Lini S. 8.

Cab. 2. 36.2 } estavam muito molhados
Cab. 4. 36.3 }

- Com uma cultura em caldo
deleto com o exsudato produzido
da col. q. 6-9-01 foram reunidos
ferrugens e uma colônia já
utilizada p. estudo de excreção.
- Foi filtrada uma cult. de
parte em caldo de Martin. Também de
23-8-01 e que apresentaram a
estrutura característica em salicilato.
- Para o estudo da determinação
de tempo da umidade constante
pelo soro foram injetados com
1cc. de soro de S. os seguintes ratos
brancos que foram fuzados com
3 seringas de soro injetado
com parte de soro de 5, 10 e 15
dias -

Serie I (a ser injectada 14-9)

Rato 1 - 230g. *Trichinina callosa* - 1cc. sôco 8

Rato 2 - 210 " " *Trichinina* " " "

Rato 3 - 190 " " *nas costas* " " "

Serie II (a ser injecta 19-9)

Rato 1 310g. *Virola na cabeça* - 1cc. sôco 8

Rato 2 145g. " " *Trichinina* " " "

Rato 3 140g. " " *nas costas* " " "

Serie III (a ser injecta 24-9)

Rato 1 175g. *Trichinina callosa e virol na cabeça* - 1cc. sôco 8

Rato 2 180g. *Virola* " " *e push* " " "

Rato 3 155g. " " *e push nas costas* " " "

10 de Setembro - Foi sacrificada a cob. 186 inici. com pote. Com o baco foram feitas culturas.

A cultura de *Luberculose* feita a 29-8 estavam florescentes. Tem muita nosa semelhança em habitado e em cult. glicerinada.

Foram comprados cos. 2 e 9.

11 de Setembro - Cob. 186 - 3. 600. 384. 4. 525. 385.

Cob. 186 - 3. 720. 4. 475. 5. 365. Cob. 186 - 240.

Cob. 186 - 240. Cob. 186 - 13. 305. 368.

Serie I & II - 2. 372. 4. 370.

- Foram injectados 3 ratos com a ultima toxina potora.

Fuam abys. Rato 1. 182g. injectado com toxina

Trichinina Rato 2. 162g. " " 0,5 "

cos. Rato 3 200g. " " 0,1 "

186

- Foi injectado no peritônio uma cabim de 225gr. com uma cult. de 24h. de pote na temp. do laborat. proc. de cob. 4 e 11-9.

- Todas as culturas se pôde bem de feitas na temperatura do laboratório e com esse facto tem se verificado a existência predominante dos primeiros filamentos. Preparação de sangue coado pelo proc. de Landeron de 24h. forneceram lindos coloridos de *Luberculose*.

12 de Setembro - Cab. alas 3.505.38.5. H. 475.39.

Cab. tab. 3.690. H. 470. 5.345. Cab. min. 265.

Cab. caten. ext. 235. Caba. des. 14k. 38.7.

Serie 8. 2.37.8. H. 39.5.

Foi sacrificada a ab. e injetada
na peritoneu. com a exantema foi
feito a cultura.

Foi injetada a cor. 9.

O cecilio ultimamente injetado
com cultura, feito para a cultura
em aparelho de sistema reacter.

Exame de fôcos membranas

13 de Setembro - Cab. alas 3.580.38. H. 550.39. 660.

Intera 3.730. H. 510. supracar. de par. 5.380.

Cab. min. 285. Cab. caten. ext. 260.

Caba. des. 146. 39. S. 8. 2.37.4. H. 37.6.

- Morreu cab. injet. na peritoneu
cab. x. B6. com a exantema foi
injetado na ab. e feita uma
cultura.

- Foi sacrificada a presença

187

de Anopheles Intzi em Hampden.

14 de Setembro - Cab. alas 3.772. 38.2. H. 522. 38.6.

Cab. tab. 3.723. H. 485. 5.370. Cab. min. 321.

Cab. caten. ext. S. H. 253. Caba. des. 14.500.38.5.

Cab. S. 8. 2.37.6. H. 37.8.

- Foi sacrificado a cor. 8 e
na im. feita membrana e fixação.
foi introduzida na carotida a fim
de evitar a hemorragia e depois
então foi suturada. Formou a um
donatoma que diminuiu de volume
alguma hora depois.

S. Serie I de rato inoculada
com 1cc de S. 8 a 9.9.01 vedou
1cc de cult. de S. 8. de pote por
de exantema pois omar cabana, com
como um rato S. 8. de 1924.

- Foi sacrificada a cult. de S. 8.
A falsa membrana de S. 8. de 1924
agor. fixou-se pela S. 8. de 1924 e
Caraba 24h foi colada em

alcohol absoluto

15 de Setembro - Cab. alv. 3.610 - 38.6 - 4.530 - 38.5
 Cab. tub. 3.745 - 4.525 - 5.402 - Cab. min. 325
 Cab. cat. ext. - 275 - Cab. alv. 14.200 - 38.7

16 de Setembro - Cab. alv. 3.605 - 38.2 - 4.545 - 38.1
 Cab. tub. 3.745 - 4.520 - 5.385 - Cab. min. 301
 Cab. tub. ext. - 235 - Cab. alv. 14.200 - 38.6

17 de Setembro - Cab. alv. 3.585 - 38.7 - 4.530 - 38.5
 Cab. min. tub. 300 - Cab. cat. tub. ext. 265
 Cab. tub. 3.710 - 4.490 - 5.380 - 5.380
 Cab. alv. 14.400 - 39.3 - (Presença de fungo na cultura)
 - Morreu a 1^h 30^t o rato teste
 número da S.I. injectado a 14.9.01
 com peste - A autópsia revelou a
 presença d'um grande volume verde e
 exame microscópico revelou a presença
 de numerosos bac. da peste. Tumor

fato cultura com o base (com f. exame
 microscópico não revelou a presença de bac. da
 e com o sangue do coração -
 Os ratos injectados com sêr. não bem -
 Não saíram a cor. 8.

18 de Setembro - Cab. alv. 3.595 - 38.3 - 4.530 - 38.5
 Encomenda da corbata formada pelo rato injectado
 Cab. tub. 3.735 - 4.495 - 5.395 - Cab. min. 310
 Cab. inj. cat. de S.H. 280 - não tem cultura nem peste
 Cab. alv. 14.600 - 38.6 -
 - Foi injectado uma colônia de 2^h 5^t
 com lcc de cult. de diphteria (a 14.9.01)
 (pro. form. S^{ta} Morfologia).
 - Foi S^{ta} geragem de inoculação a 1.16
 e reinfecção 5 por lcc de cultura
 existe 14 mgf. de corpo microbiano
 (depois de desidratado o pro. de Kahl
 e de mat. org. de calor)
 - O estado de vida existente no Instituto é
 de 10.760 p. em 524 p. em 22 de 100

Depto. estas entremetido prompto a
após 316 ridos de 20cc e 28 de 10.
representando 6.600 cc de soro. Contendo
com o tubo separados por deflato e
Hoch ^{montado} a de 603 r. de 20cc e 28 r. de 10cc
representando 12.340 cc. de soro.

19 de Setembro. Cab. obs. 3.610. 385. 4.525. 37.8
Cab. tub. 3.725. 4.500. 5.385. Cab. min. 315
Cab. esc. tub. bimp. 245. Cebra de 14 grs. 32.
Foi injetada a Série II de ratos
injetada com soro a 9-9-01 com
1cc de calt. em caldo feito a 10-9-01
de Peac. de pote prot. de base 2mm
Cab. + a 10-9. Com essa porção foi
inoculada em ratos *L. terrestris* de
142 gr.

20 de Setembro. Cab. inj. de 3.610. 38. H. 545. 38.
Cab. min. tub. 335. Cab. cur. bimp. 290.
Cab. tub. 3.725. H. 510. 5.405.
Cebra de 15 gr. 39°

A cultura apresenta-se no ponto da

última inoculação em tumor
flutuante de 2 semanas 2mm de
de galinha. Foi preparado ad
aspiradamente sendo recolhido um
nuc. primário com a qual foi
feito preparações e uma cultura
em caldo. Os preparações ex
lavaram a presença de *L. terrestris*
e massas amorfas. A cultura
conversou-se e alterou (24 h.).

Foi encontrada morte
a cab. injetada com bi. faldem
a 18-9. A autópsia revelou
as lesões características da *L. terrestris*
(confusão 2. cegonhas super
unus. demencia planal). O
exame microscópico do ponto se
inoculou revelou a presença
de bacilos *L. terrestris* de man
englobados pelo *L. terrestris*.

Foi reinjetada aspiaticamente

no coágulo a sublinjeada com
sangue & carallo no dia 15-7-01
2-8-01; 13-8-01; 24-8-01 e 2-9-01

O sangue foi recolhido numa Petal e
posto a coagular —

21 de Setembro — Cal. elev. 3.625. 38.4. H. 555. 39.
Cal. min. sup. tub. 335. Cal. cor. tub. de inf. 300.
Cal. tub. 3.745. H. 505. 5. 395. Cal. elev. 15.500. 38.8
— Foi enviada a reacção do
sangue hemolítico segundo o
precon de Whlenhuth. (Dets. med.
Week. 1901. N.º 6. pag. 82). —

22 de Setembro — Cal. elev. 3.620. 38.3. H. 550. 38.6. Cal. min.
sup. 345. Cal. inq. cat. de inf. 310.
Cal. tub. 3.730. H. 525. 5. 400.
Cal. elev. 15.200. 39.

23 de Setembro — Cal. elev. 3.615. 38.5. H. 550. 38.5
Cal. min. sup. 350. Cal. tub. inf. 305.

Cal. tub. 3.705. H. 520. 5. 390.

Cal. elev. 38.5. 15.300.

— Foram preparados rolos de sac
cina Hoffall. dorada na praga
de 2cc de soro (plasma) = 3mg. de
corpo microscópicos —

24 de Setembro — Cal. elev. 3.630. 38.4. H. 555. 38.5. Cal. min.
sup. tub. 365. Cal. cat. de inf. 315. Cal. tub. 3.775.
H. 510. 5. 410. Cal. elev. 15.500. 38.6.

Foi preparado calbe onde a
neutralização levada a cabo ao
"ponto do tommer" sempre foi
verificada e o desenvolvimento do
bac. da parte em calbe não se
fezia bem no calbe neutralizado
ali e "ponto da phthalina" —

25 de Setembro — Cal. elev. 3.625. 38.9. H. 525. 38.3
Cal. min. sup. tub. 365. Cal. cat. de inf. 315.
Cal. tub. 3.750. H. 495. 5. 385. Cal.
elev. 15.400. 38.9.

26 de Setembro. Cab. oleo 3.535. 38.6. 4.555. 38.3
 Cal. urina sup. 370. Cal. cat. ant. tub. h. 310
 Cal. tub. 3.735. 4.500. 5.390.
 Cal. oleo 15.400. 39.3.
 Foi injetada com 7cc 2^a injeção
 emulsion de cálcio de peixe de 24h.
 a Série III de rato injetado com
 soro a 9-9-01. O rato 3 jours
 foi visto injectado no peritórax.
 Com a urina foi injetado um
 rato *Stemmipia* de 235 gr.
 - O rato *latum* e o rato de SII
 não morreram até a presente
 data aparece a cultura de *St. attenuata*.

27 de Setembro. Cab. oleo 3.615. 38.8. 4.555. 38.7
 Cal. urina sup. tub. 365
 Cal. cat. ant. tub. deinf. 310
 Cal. tub. 3.710. 4.505. 5.380
 Cal. oleo 15.200. 39.3.

28 de Setembro. Cab. oleo 3.620. 39.7. 4.545. 38.5
 Cal. urina sup. tub. 375.
 Cal. cat. tub. deinf. 320.
 Cal. tub. 3.735. 4.515. 5.405
 Cal. oleo 15.400. 39.
 O cas. 5. teve um aborto
 durante o tempo da placenta.
 Morreu e entes a 3. Set. inj. com peixe a 26-9-01.
 29 de Setembro. Cab. oleo 2.553. 38.4. 3.635. 38.7.
 Cal. urina sup. 405. Cal. cat. deinf. 327
 Cal. tub. 3.790. 4.545. 5.435.
 Cal. oleo 15.500. 38.7.

30 de Setembro. Cab. inj. oleo 3.635. 38.5. 4.500. 38.7.
 Cal. urina tub. 420. Cal. cat. ant. tub. 345
 Cal. tub. 3.760. 4.540. 5.425.
 Cal. oleo 15.300. 39.2.
 1 de Outubro. Cal. oleo 3.630. 39. 4.575. 38.5.
 Cal. urina 405. Cal. cat. ant. tub. 345
 Cal. tub. 3.745. 4.520. 5.415.
 Cal. oleo 14.200. 38.8.

2 de Outubro. Cal. oleo 3.640. 38.5. 4.575. 38.7.
 Cole. min. sup. Cal. col. ant. inf. 350.
 Cal. tub. 3.785. 4.545. 5.420.
 Calza oleo 15.600. 39°.

189

Tai injectado na punção
 com uma cultura de parte de 48h
 uma cultura.

3 de Outubro. Cal. oleo 3.640. 38.5. 4.565. 39.
 Cole. cor. inf. 350. Cal. tub. 3.760.
 4.530. 5.395. Calza oleo 15.700. 38.8.
 Morreu às 3h. a col. tub. 0.
 A autópsia revelou a existência
 de lesões int. interessantes. O fígado
 enormemente aumentado de
 volume e com algumas anastomoses
 apresentava numerosas bossas.
 O baço enorme de cerca de
 8cm de comprimento apresentava
 manchas amarelas. A
 curvadura peritoneal foi enco-
 ntrada com abundante ferramen-

hemontapia. O pulmão esquerdo
 curvado de tuberculos de expecto-
 ritas. Fragmentos dos rênones
 miceros foram fixados em
 álcool absoluto. 1ª cordão
 uterinos. Uterum conservado
 em formal. O baço e o fígado
 — tendo abastado, com a epu-
 parafestamente sumonizados
 contra a parte para encimar
 a água exposta pelo corte
 na superfície da parte. Dura
 me foram injectados duas vezes
 com uma mistura de leite
 de água e de cultura e com
 certamente uma com leite
 de vaca e parte e outra só
 com parte. De este modo:

190-

Vol. 1

Cal. 1. Trichina na calza - 230gr. 38.7.
 Dente branco e ruivo. Mancha ruiva no fronto.
 Mancha preta no flanco. Espirido

Resto de corpo branco. Pelle arrugada
Injetada no peritomeu com $\frac{1}{2}$ cc de
cult. de 24h de pote, em caldo.

Col. 2 - Trichium in frum. - 185. 38.5.

Ruiva. Pelle lise. Injetada no
peritomeu com uma mistura de
 $\frac{1}{2}$ cc de cult. de pote em caldo de 24h e
1cc de leite ou capote 5 -

Col. 3 - Violeta na cabeça - Pr. 195 - 38.8.

Ruiva, branca e preta. Cabeça branca. Lado
esquerdo de focinho preto. Quarte posterior
esquerdo branco. Resto de corpo ruivo.
Pelle lise - Injetada no peritomeu
com $\frac{1}{2}$ cc de cult. pote (caldo 24h) e 1cc
de leite de vacca esterilizado.

Col. 4 - Violeta no tronco. 195. 38.8. Ruiva
e preta. Quarte post. esquerdo preto. Lado
esquerdo de focinho preto. Resto de corpo ruivo.
Pelle lise - Injetada no peritomeu com
 $\frac{1}{2}$ cc de cult. pote (caldo 24h), e 1cc de
leite de 5 -

4 de Outubro - Col. deo. 3.640. 38.4. 4.560. 38.1.

Col. inj. cat. tub. desinf. 345. Col. tub. 3.740. 5.615.

Calva alva - 16000 - 38.6

5 de Outubro - Col. inj. deo. 3.635. 38.8. 4.560. 39.

Vento - Fajarda. Col. inj. cat. tub. comp. 355. Col. tub. 3.750. 5.415.

Secubus - Leri e Col. deo. - 16000 - 39°.

Spine - Morreu o rato *Portunus*
da Serie III inoculada com feto
a 26. 7^{ho} - Toram 1^o cultura
- Morreu a col. injetada no
peritomeu a 2 de Outubro - Foi retirada
o exudato e com elle injetado
uma

194 Col. 232. Temp. 39.2 -

6 de Outubro - Col. deo. 3.659. 38.2. 4.565. 38.1.

Col. tub. 3 - 767. 5.120.

Col. cat. tub. alt. 375.

Col. ruiva exp. 134.

Calva alva 166. 38.7

196

BR. RJ 000 OC. PI. TP. 57. I f. 89. v

7 de Outubro - Cab. alv. - 3.655. 38.5 H. 570. 38.7
 Faltas e Manchas - Cab. tub. - 3.760. 5. 1120.
 Malária Lenta. Cab. cat. tub. - 370.
 Cabra - 16.600. 38.5.

No noite de 5.ª e 6.ª morrem
 Rato n.º 1 da S. III. Fome e
 antipneumonia e cultura.
 - Cab. 2.ª test. pele e leite (192) mas
 com pele e leite de ração a 3.70. v.
 Foram feitas antipneumonia, prep. e cultura.

8 de Outubro - Cab. alv. - 3.660. 38.6. H. 580. 39.
 Cab. inj. cat. tub. 380. Cab. tub. 3.750. 5
 425. Cabra alv. 16.200. - 38.7.
 Então quando a enferma foi vacunada
 a cab. inj. com epidade penicilina a
 5. 10. 01. (out. 194) foi feita antipneumonia,
 prep. e cultura -

9 de Outubro - Cab. alv. 3.650. 38.3. H. 570. 38.7.
 Cab. cat. tub. denif. 390. Cab. tub. 3.740
 5. 430. Cabra alv. 16.000. 39.3.

176-196

BR. RJ 000 OC. PI. TP. 57. I f. 90

197

10 de Outubro - Cab. inj. alv. 3.620. 38.8. H. 570. 38.7.
 Cab. cat. tub. denif. 405. Cab. tub. 3.805
 5. 435. Cabra alv. 16.600. 39.

Morreu a cab. test. injectada
 no peritônio com pele a 3.9. v.
 (cab. n.º 190). A antipneumonia revelou
 as lesões da pele subcutânea no lugar
 foram feitas culturas e prep. ar. g.
 que revelaram a presença de bac.
 da peste -

Foi sanpneumonia em 6.ª e 7.ª
 cor. 2 que teve uma 2.ª antipneumonia
 Conexão e a imunização do
 car. n.º 12. injectado e 1.ª de
 cultura morta - Conexão e
 a preparação pequena, progressiva
 de 5.ª p.º ração -

11 de Outubro - Cab. alv. 3.650. 38.5. H. 570. 38.5.
 Cab. cat. tub. denif. 410. Cab. tub. 3.795. 5. 430.
 Cabra alv. 16.100. 39.

177-196

- 12 de Outubro - Cal. elev. 3.630, 38.6. 4.575-38.8
 Cal. cat. tub. 425. Cal. tub. 3.790. 5.435
 Cal. elev. 16.4. 39°
- 13 de Outubro - Cal. elev. 3.640, 38.2. 4.590-37.7. Cal. cat. tub. 425. Cal. tub. 3.790. 5.425.
 Cal. elev. 16.200. 38.6.
- 14 de Outubro - Cal. elev. 3.650-38.8. 4.605-39°. Cal. cat. tub. 425. Cal. tub. 3.795. 5.430.
 Cal. elev. 16.200. 39°
- 15 de Outubro - Cal. inj. elev. 3.638-38.8. 4.625. 38.5.
 Cal. cat. tub. 425. Cal. tub. 3.820. 5.435.
 Cal. elev. 16.500. 39°-1.

195-

- Foi injetada no peritônio com
 soro com a caloria de 262 p. 37.5-

- 16 de Outubro - Cal. inj. elev. 3.620. 38.4. 4.595-38.5.
 Cal. cat. tub. 425. Cal. tub. 3.785. 5.430.
 Cal. elev. 16.700-38.8-
- 17 de Outubro - Cal. elev. 3.630. 4.590. Cal. cat. tub. 425.
 Cal. tub. 3.840. 5.435. Cal. elev. 17.6. 39°
- 18 de Outubro - Cal. elev. 3.610. 38.6. 4.560-38.3. Cal. cat. tub. 425.
 Cal. tub. 3.750. 5.395. Cal. elev. 17.6. 38.9.

- 19 de Outubro - Cal. elev. 3.625-37.9. 4.595-38.
 Cal. cat. tub. 425. Cal. tub. 3.790. 5.415.
 Cal. elev. 17.6. 39°-1.
- Morreu a cal. inj. a 18. foi resuscitada e
 examinada com o pulmão perfurado.
- 20 de Outubro - Cal. inj. elev. 3.645-39°. 4.615-37.2. Cal. cat. tub. 425.
 Cal. tub. 3.800. 5.430. Cal. elev. 16.800. 38.8.
- Truque com a cal. inj. - Depois da vacinação proposta a Prosa.
 Reação de exacerção de 400 da emulsão
 concentrada: 1.º 72.5 mgr. 2.º 75.5.
 Foi dada a cal. inj. de 72 mgr.
 Houve 2.º 72 mgr. 1.º 18 mgr. Na 66 75 mgr. 1.º 75 mgr.
 3.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 4.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 5.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 6.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 7.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 8.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 9.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 10.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 11.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 12.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 13.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 14.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 15.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 16.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 17.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 18.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 19.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.
 20.º 75 mgr. 1.º 75 mgr. 2.º 75 mgr. 3.º 75 mgr.

- 21 de Outubro Cal. elev. 3.655. 38.3 H. 610. 38.4 - Cal. inf.
 cat. tub. demif. 460. Cal. tub. 3.795. 5.435.
 Calbra elev. 16.900. 39.2.
- 22 de Outubro Cal. elev. 3.655. 38.8. H. 605. 38.7.
 Cal. cat. tub. demif. 1.455. Cal. tub. 3.785.
 5.425. Calbra elev. 39.7.
- 23 de Outubro Cal. elev. 3.650. 38.0 H. 620. 38.8.
 Cal. cat. tub. demif. 480. Cal. tub. 3.815. 5.435.
 Calbra elev. 17.400. 38.3.
- 24 de Outubro Cal. elev. 3.660. 38.7. H. 605. 38.5 Cal. cat. tub. demif. 495
 Cal. tub. 3.805. 5.440. Calbra elev. 16.800. 38.9.
- 25 de Outubro Cal. elev. 3.655. 38.4. 5.590. 38.4 Cal. cat. tub. demif. 490
 Cal. tub. 3.780. 5.430. Calbra elev. 16.900. 38.9.
- 26 de Outubro Cal. elev. 3.665. 38.3. 4.575. 38.1. Cal. cat. tub.
 demif. 495 Cal. tub. 3.805. 5.430. Calbra elev. 17.200. 38.9.
- 27 de Outubro Cal. elev. 3.665. 38.4. H. 615. 38.7. Cal. tub. demif. 492
 Cal. tub. 3.810. 5.408. Calbra elev. 18.4. 38.8.
- 28 de Outubro Cal. elev. 680. 38.4. H. 610. 38.2 Cal. tub. demif. 499.
 Cal. tub. 3.825. 5.435. Calbra elev. 17.300. 38.5.
- 29 de Outubro Cal. elev. 3.660. 38.2. H. 620. 38. Cal. tub. demif. 520
 Cal. tub. 3.815. 5.465. Calbra elev. 17.500. 39.

- 30 de Outubro Cal. elev. 3.680. 38.8. H. 620. 38.5.
 Cal. tub. demif. 520. Cal. tub. 3.805. 5.425.
 Calbra elev. 17.500. 38.5.
- 1 de Novembro Cal. elev. 3.680. 38.3. H. 635. 38.5.
 Cal. tub. demif. 515. Cal. tub. 3.815. 5.425.
 Calbra elev. 17.600. 38.8.
- 2 de Novembro Cal. elev. 3.680. 38.5. H. 640. 38.2. Cal. cat. tub. demif. 520
 Cal. tub. 3.795. 5.435. Calbra elev. 17.800. 38.8.
- 3 de Novembro Cal. elev. 3.695. 38.2. H. 645. 38. Cal. cat. tub. demif. 527.
 Cal. tub. 3.835. 5.425. Calbra elev. 18.000. 38.6.
- 4 de Novembro Cal. elev. 3.670. 38.3. H. 640. 38.8. Cal. cat. tub. demif. 520.
 Cal. tub. 3.815. 5.425. Calbra elev. 17.500. 39.
- 5 de Novembro Cal. elev. 3.680. 38. H. 620. 38.2. Cal. cat. tub. demif. 515. pr.
 Cal. tub. 3.790. 5.430. Calbra elev. 17.500. 38.8.
 - Leon a cultura de peste existente no
 laboratório e com o fim de exaltar a
 virulência foram inoculados 2 agt. min.
 Calbra elev. 465. 38.3. Inoculada com
 peste na mucosa nasal.
 Rato - 240g. 38.1. inoc. com peste na
 conjunctiva.

Foi emendada a raça. Haffla alemão (branco a 3mg porcc) foram inseridos a seguinte número.

Serie G Haffla

197

Col. 1. Fuchsin na cabeça. Br. 200. 38.
Machado de pasta e ruiva na metade superior do corpo. Focinho branco, cabeça preta. Metade post. do corpo branca. Delle arripado. Injetado sob a pelle da coxa com 0.5 da racema.

198

Col. 2. Fudo. Branco. 235gr. 37.8.
Machado de pasta e ruiva. Quarta parte superior e anterior direita ruiva. Delle br. inj. na coxa com 0.5 da racema.

199

Col. 3. Violeta na cabeça. 190gr. 37.6.
Branca, mancha preta sobre a orelha superior e ruiva sobre o dorso. Mancha preta no dorso, circunscrita numa pequena mancha ruiva. Delle arripado. Injetado sob a pelle da coxa com 0.5 da racema.

200

Col. 4. Violeta na cabeça. 170gr. 37.5.
Pasta, mancha branca na cabeça superior de focinho. Mancha branca no quarto posterior. Mancha ruiva sobre o orelha superior. Injetado sob a pelle da coxa com 0.5 da racema.

Serie H (ratos) Haffla

Rato 1. Fuchsin na cabeça. 200gr. 37.6. Inj. com 0.5 da racema.
Rato 2. Fuchsin na cabeça. 165gr. 37.5. Inj. com 0.5 da racema.

Rato 3. Violeta cabeça. 185gr. 38.3. 0.5 racema.

Rato 4. Violeta corpo. 194gr. 0.5 da racema.

5 de Novembro

Col. deo. 3.680. 38.9. 4. 635. 38.3. Col. out. 5. 530.

Col. tub. 3. 325. 5. 430. Cabe. deo. 186. 39.3.

Serie G. Haffla (Cabeças) e Haffla

1. 205. 37.7. 2. 245. 37.8. 3. 200. 38.5. 4. 180. 38.3.

Serie H Haffla (ruiva)

1. 200. 38.5. 2. 170. 38.8. 3. 190. 38.6. 4. 200. 38.8.

A cabeça inoculada em focinho foi reincubada com mais bore.

7 de Novembro - Cab. alv. 3. 700. 38.8. H. 640. 38.8.
 Cab. cat. amp. 545. Cab. tub. 3. 800. 38.8.
 Cab. racemada S. 1. 215. 37.5. 2. 265. 37.8.
 3. novem. 4. 175. 37.6. Rato racemado -
 1. 205. 38. 2. 180. 38.5. 3. 190. 37.8. 4. 195. 38.2.
 Calbra. alv. 18. 200. 39.2.
 Foi antepariada a cab. racemada r' 3.
 Protocalla da anteparia:
 Ganglio axillars e injunias. Vamanto
 mais ou menos normal porém forte-
 mente conformationado.
 Ponte de miculogus (cora). Nada de
 notad a não se intem. confora-
 d'um ganglio existit nos miculogus.
 Peritoneo. Perone exubate lipida.
 mente suco.
 Estomago. Normal.
 Intestine selgado. conformationado.
 Erone intestine. Porque infere de pro-
 int. com suffusos sanguineos no muscu-
 ligado. Apote normal. Veneida

bibeus chira -
 Baes. Confora. pepens -
 Capelos sup. renas - Ligeranti conformationado
 com eschymos -
 Rim. confora.
 Bexiga. varia. retratada
 Ductos confora. com zona de emphysem.
 Coracur. normal.
 Toram. feto. proparos. com obso-
 e ganglio pre nata. adlarcom -
 Scastra foi de nove injetada
 sob a pelle com cerca de 3cc de
 oleo de fig. de lico. com 2% de cera.

8 de Novembro - Cab. alv. 3. 675. 39. H. 650. 39.
 Cab. cat. amp. 540. Cab. tub. 3. 825. 38.5.
 Cab. race. S. 1. 210. 38.2. 2. 255. 38.5.
 4. 180. 37.7. Rato race. 1. 210. 38.5.
 2. 185. 38.4. 3. 195. 38.4. 4. 200. 38.
 Calbra. alv. 18. 40.5.
 Foi injectada com sota a septo.

202

Cal. Pr. 254. Injeção ne peritoneu com 2cc. d'uma cult. em caldo de 48h. de bac. da peste d'um foi feita a 3h. 15'.

Temperado - cult. de leite de 48h.

Paragon

d'1 cult. em agar de 24h. semeado por sôria com leite e conservado na estufa a 35' 4h. foram embrioados n'água destilada. A embria obtida foi evaporada e o resíduo foi pesado, após dessecar em banho de H₂O⁴ a 24h. O peso obtido foi de 315,5 mgr. e se dá para cada tubo 63mg,5 -

Após de dose a mot. animal n' foram tratados em branco 5 tubos, após por água destilada o resíduo foi evaporado em banho maria e resíduo 24h em banho de H₂O⁴ e verati. O peso obtido foi de 164mgr,5 e daí 32 mgr,8 por tubo -

A embria vaccine concentrada e lavada preparada a 5-11 foi dosada e encerrada por lce. 16mgr,75 e mot. salidas. A vaccine preparada com embria lavada e não concentrada e rica em corpo morto. Lépido era, colorido o por de microbio para a cultura estufa no laboratório e para 1 tubo de agar e de 30mgr,7 -

9 de Novembro - Cal. des. 3.085^{38,75} 4.630. 37. Cal. tub. inf. 545. Cal. tub. 3.000. 5.430. Cal. vac. S. G. H. ad. 1.225. 325. 2.270. 385. 4.190. 38. Ser. H. Ad. rito. 1.195. 376. 2.100. 38. 3.190. 378. 4.195. 378. Cal. des. 11.500. 40.2. Foram injectados ne peritoneu com 0,5 de cult. de leite em caldo p^{to} a 6h. ou extra amoniac.

203

Cal. n^o 1 e 2 de S. G. H. (197 e 198 e uma testemunha de 232gr.

Rato - 3. 4. S.H. Hall e menor

Determinada de 190gr -

Fais

10 de Novembro - Cal. alio 3.690.38.3. 4.605.38.2

Cal. cat. deinf. 555. Cal. tub. 3.808. 5.435.

Cal. S.G. Hall 4.190.37.8. Rato S.H. Hall
1.205.38.3 2.180.38.5 Cal. 17.200.40.2.

11 de Novembro

Cal. alio 3.695.38.3 4.655.39. Cal. tub. deinf. 560

Cal. tub. 3.845. 5.440. Cal. S.G. Hall 4.195.37.5

Rato S.H. Hall. 1.205.38.3. 2.185.38.5.

Cal. 17.200.38.6.

- Morua às 2h. a cabana moída.
Com parte na mucosa nasal nos dentes
4 e 5. (cal. n. 196) - Foi feita a análise
e nada revelou de relevante. Não
havia alterações p^{as} o fungos. De-
pósitos microscópicos p^{as} com o baco
e sempre nada revelaram. Depósitos
com o pulmão sem caro bacilo. Foi
feito cultura com o baco e pulmão.

12 de Novembro - Cal. alio 3.690.38.2 4.645.39.

Cal. cat. deinf. 555. Cal. tub. 3.855.

5.435. Cal. S.G. Hall. 4.205.37.5 Rato

S.H. Hall. 1.205.39.2 2.190.39.

Cal. alio 17.400.38.7.

Morua às 2h. a cab. incalculada
na pelle de *Stomoxys calcitrans* (p. 5-XI-61)
(cal. n. 201) - Foi feita análise para
revelar a presença de Callos tubos
infrinaes. Baço com aspecto na-
mal. Foram feitas culturas com an-
tibio e com o baco -

- Estabelecimento às 2h.30
da tarde a cal. n. 202 impossível no
resistente a 1 de Novembro foi reexa-
cada. Retirou-se da caridade por ter
abundante exudato hemorroidal
com o qual foram feitas culturas
e incalculada por picada no pulmão
uma outra cabana - 23gr.

204.

192

BR. RS. CDC. OC. PI. TP. 57. 1. f. 97. v

13 de Novembro — Cab. alv. 3.670. 39.6. 4.650. 38.7

Cab. cul. tub. anif. 560. Cab. tub. 3.850. 5.440

Cab. S.G. r. half. ar. 4.205. 38.3. Rato S.H. 1.215 37.5

2. 390. 38.2. Calva alv. 17.100. 39.5.

205

— Com cult. em calva (20%) do exantema
peritoneal foi injetada no peritônio
uma calva de 212 gr.

14 de Novembro — Cab. alv. 3.655. 39. H. 650. 38.8. Cab. tub. anif. 575.

Cab. tub. 3.850. 5.430. Cab. S.G. half. 4.210. 38

Rato S.H. half. 1.215. 38.5. 2. 190. 38.2.

Calva 17.400. 39.9.

— Estender m^{te} doente a cab. 205 foi
sacrificada onde recolheu e exantema
peritoneal com e pul. forum f. *Callosus*— Foi encontrado a cab. race. n^o 1.

S.G. H. all. inj. com peste a 9-XI-01.

A antorrina revelou lesões da pele
com e exantema peritoneal existente
foi injetada sob a pele uma a
cab. de 245 gr.

206

A cab. testemunha n^o 203 injetada

BR. RS. CDC. OC. PI. TP. 57. 1. f. 98

193

como as vacinadas a 9-XI-01 mas com
as 6.30 T.

15 de Novembro — Cab. alv. 3.700. 38.9. 4.655. 38.7. Cab. cul. anif. 580

Cab. tub. 3.840. 5.440. Cab. race. S.G. half. 4.215. 37.5

Rato S.H. half. 1.220. 38.2. 2. 195. 38.5.

Calva alv. 17.300. 39.3.

16 de Novembro — Cab. alv. 3.680. 38.3. H. 650. 38.5

Cab. tub. anif. 575. Cab. tub. 3.840. 5.420.

Cab. S.G. half. r. 4.220. 39.2. Rato S.H. 1.215. 37.5

2. 185. 37.5. Calva alv. 17.600. 39.

— Com cult. de 48h. p^{ta} prontamente com
e exantema peritoneal da cab. sacrificada
a 14-XI. (cab. 205) foi injetada no
peritônio uma cab. de 206 gr. 38.4. e Rato
com 0.5 de cult. em calva —

207

— Onde consiste e cab. injetada no
peritônio com 3cc de exantema concentrado
feito a 5 de Novembro foi de 206 gr. 38.4
no peritônio com 0.5 de m^{te} cultura
acima empregada, assim com um rate
testemunha de 245 gr. 37.1

Ensaio de vacinação sobre o posto.

Foram injetadas em separado colônias

Col. 1. 212 gr. - 3^{ra} 3^{ra} ^{tubo colônias} Manchas ruins no
quarto posterior, prolongando-se pelo
membro posterior direito. Manchas ruins
sobre o olho e o olho. Região mancha
preta sobre o olho direito. O resto do
corpo branco. Pelos lisos. Injetando
sali a pelle da coxa com 0,5 de
calor em calor 1^{ra} a 14. xi com exudato
purulento. Os cas. + a 12. x 1. Testemunha

209-

Col. 2. Fuchim. m. f. 205 gr. 38.2

Branca, preta e ruína. Mancha ruína no
quarto post. espande animado u. i
contínua preta em flancos direito. Mancha
preta sobre o olho e o olho e o olho
ruína sobre o olho direito. O resto do
corpo branco. Pelos lisos. Injetando com
0,5 de calor m. f. a 1. e na coxa
oposta com lcc de vacinação

Col. 3. Colônia vacinada a 4-11-07 e
descripta sobre em 4 (220) Injetando
com 0,5 de m. f. cultura

19 de Novembro. Col. des. 3. 705. 38.1. 4612. 38.4

Col. tub. 3. 835. 5. 430.

Rato S.H. 4. all. 1200 gr. 38. 2. 193-378.

Col. des. 17^{to} 7 38.7

- Com cult. do ex. purulento
por injetarem no membro man-
cheira -

210

18 de Novembro. Col. des. 3. 675. 38.5. 4630. 38.3

Vid. Soma. f. 10. Col. tub. 3. 810. 5. 430

Rato S.H. 1. Ha. 1. 220. 38.8. 2. 195-38.

Col. des. 18^{to} 38.8

Apesar a col. 210 injetado a 17. foi
feita a colheita do exudato purulento
com o qual foi feita uma cultura
e miculada no purulento man-
cheira -

211

17 de Novembro - Cal. deu 3.675 38.2 4.644 38.3

Cal. de 3.846 5.429

Rat. S.H.v. h. 1.200 38.2 2.209 37.9

Cal. deu 18.300 38.9

Morreu a cab. 211 inj. a 18.300 01.

foi recolhido e exp. junto com a parte
por ser cultura -Com a cultura em calde 1^{ra} com
a cab. + a 18-XI (ex. 214) foram
injetados 2 cabais -Cab. 194 injetada com 1 gota
ne perfume da cult. encalhe de 24h.Cab. 165 injetada cab. e pelle
da coxa com 0.5 na m^{ma} cultura -- Jende colide e borne forte
na cabala e ^{parte de}
nos e fronton, (18-XI) colocados na
m^{ma} cabala 2 horns pranchados de
S. Paulo e estirada de boi Paua
e dias -