




I. Coração de carneiro (peixe de Hui)
incluído em parafina - (em vidro)

II Coração parasitado com moléstia
de Chagas (Paulo) Incluído em
parafina -

III Coração normal de boi (peixe de
Hui) incluído em parafina.

IV 1 bloco de coração parasitado
com moléstia de Chagas.

V 3 blocos, embriões de cello
e os ovários, 20 blocos.

At Cello's from secundado. a 24.6-15

Trinocular a 27-6-15

Apresenta Tuppam a 11-7-15

for sacrograta a 14-7-15

VI e bloco de corações humanos -
(fixe a 11-7-15) (duas vias)
incluindo em parafina - (em vidro)

VII Coração e membros de
gamba impregnados com
nitrito de prata resplandecente

VIII. Órgãos de gamba impregnados
com espirichato - fixados em
sublimado álcool - (em vidro)

IX Órgãos genitais e um
sobolho macho, infectado por
a moléstia de Chagas -
Sublimado álcool -

(em vidro)

X Presso - órgãos de
um cão e paludismo -
(em vidro)

XI 4 blocos fixados em
sublimado álcool parafinados
com moléstia de Chagas -

Philomera -

XII - Fixe a 11-7-15 humano
Coração fixado em formal -
normal -

XIII Faixa de H₂O de Carneiro
incluída em cellodina.
com vidro —

XIV órgão de gamba
Impregnado em nitrato de prata
(aspiração) — 5-7-911.

XV órgão de gamba — Spinochaeta
Fixação formal. a 10%.

XVI órgão sexuais de uma
cobrça fêmea.
Moléstia de Chagas.
Fix. Sublimado Alcol.

XVII um bloco ~~de~~ do parafuso
de ~~uma~~ faixa de H₂O de
cavaco em que se preparou
a faixa e se conservou.

XVIII — bloco de órgão
do fillo do coelho 43 —

XX e XX. bloco de
útero, placenta e em órgão
de ~~um~~ coelho — que apresentou
Pygmaeoma em circulação —
Formol. 10%.

31. 1. 9/6.

1 rato ~~mais~~ marcado ~~incubado~~
 sob a pele com ~~suco~~
 o ganglio sub-maxilar de
 Lencemur

1 rato marcado com guckenia
 incubado no peritônio com
 suco o ganglio sub-maxilar
 de Lencemur.

1 cobaia não marcado
 incubado com suco o
 ganglio sub-maxilar de Lencemur.

1 cobaia marcado com guckenia
 incubado ~~no~~ peritônio com
 suco o ganglio sub-maxilar de Lencemur.

817.1.16

1. exco. moulant con
 sur angul. submaxilla
 & lunulato. f. h
 & pelle.

Techn. synthetico
Beurman - Forget!

Ed. Foltrain
 Nouvelles methodes
 de
Sero diaphanite
 primum d'elite -

Magouder
 pelo Deser as Complexus
 —

Hematoxylin Delapfield.

Sol. 1. *Hematoxylin*.. cristall. - 1.0
 Alcool absoluto - 6.00.

Sol. 2. *Shuenem ammoniacal* 15.0
 Dissolver a grut em agua
 100cc.

Filtrar depois de frio.

Agitar estas 2 soluções e deixar
 expostas à luz em um copo
 ou vidro de boca larga
 estampado. durante dois a
 tres dias.

Filtrar novamente e agitar
 a solução seguinte:

Sol. 3 - *Glycerin Price* { a. v.
 Alcool metylico { 25 cc.
 Decorrer 5 dias tomar
 a filtrar e so' usar
 4 semanas depois.

Sublimado Alcool Schaudinn

Sol. a quese saturada de sublimado 2 partes
 Alcool absoluto 1 parte.

Hematophysalis de Heidenhain

Hematophysalis - cryst. — 1,0

Alcool absoluto 10,0

Água destilada 90,0

Uzer 4 semanas depois.

Hematophysalis de Hauser

Sol. A. *Hematophysalis* cristos. 1,0

Alcool absoluto 10,0

Sol. B. Shimmer de Polini 20,0

Dissolver a pimenta em

Água destilada 200, cc

Filtrar depois de frito.

Sol. C. Permanganato de potássio 1,0

Água destilada 16,0

Não se agita, lançar a

sol. A e B em uma

capsula de porcelana com

3 cc da sol. C. aquecer

até a ebulição agitando

continuamente, deixar

perver 1 minuto; desfrigar

rapidamente deixando

boiar a capsula em

água —

Filtrar-se

Hematoxylin a Rosenbach

Alcool a 96° 100 cc

Hematoxylin 1,0.

Usar. 4 semanas depois.

Líquido de Müller

Bichromato de potássio 20,0

Sulfato de sódio 10,0

Água quente 1 litro

Kaiserling.

Sol. 1.º Formol 400 cc

Acetato de potássio 50,0

Acetato de potássio 20,0

Água 2 litros

Conservar os pecs. 20 a 60 dias

e passar para a

Sol. 2.º Alcool a 90°

2 horas

Sol. 3.º Glicerina 1.800 cc

Acetato de potássio 900,0

Água filtrada 3 litros

Agar para Anaba. 21 lb
 Caldo simpls. 50 cc
 Agua destilada 750 cc
 Agar 50.

V. Giron. Curtis.

I. Metodo de Pierre Bourcien
 Fixado os tecidos - alcool, formol
 Guicker sublimado
 Coloracao - Nucleos - Coran
 - nucleos por 1 soluc. diluida
 de hematoxylin de Delapfeld.
 (formula do tratado de Heming).

Hematoxy. de Delapfeld. 40 cc
 Agua destilada. 160 cc.

Deixar o cor. sobre o tecido
 15 min. ate a coloracao muito
 intensa dos nucleos e comeco
 a coloracao do plasma.

Lavar em agua destilada e
 depois em agua ordinaria.

O ácido conjunctivo. e o fêmur
 O ácido conjunctivo cora-se
 electivamente em vermelho
 por meio do Ponceau S extra
 Fazer 1 sol. a 2% em
 Ponceau S extra em agua
 destilada.

Preparar:

Sol. aquosa a 2% de Ponceau ext.

q. 1/2 cc

Sol. de agua phenica saturada 9 1/2 cc

Sol. de ácido acetico 2% 1/2 cc

colocar o corte após ter
 obtido a coloração de murex
 nesta mistura durante 15 a 30

segundos.

Lavar. Agua - alcool 95°

alcool absol. xylol. balsamo.

Leucker

Müller 100 cc

sublimado 5,0


Acid acetico 5 cc.

Flemming.

Acid chromico a 1% 100 cc

" osm. a 2% 24 cc

Acid acetico 0, cc.



BRR3cc.0c.7I.7R.15.4 + 12

INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Coleção Oswaldo Cruz
BIBLIOTECAS

20-XI-17 João Francisco 68

