

NOVO GÊNERO DE FLEBOTOMÍNEO DAS AMÉRICAS

O Centro de Referência Nacional e Internacional para Flebotomíneos do Centro de Pesquisas René Rachou (FIOCRUZ / MG), recebeu alguns exemplares desses insetos, que são os vetores das Leishmanioses, procedentes do Piauí, de uma área de cavernas, enviada pelo seu ex-aluno do Curso de Capacitação para Servidores de Nível Médio e Superior em Taxonomia de Flebotomíneos, Antônio Carlos Lima da Silva, para que fosse analisada a espécie.

Após o estudo realizado por Alda Lima Falcão e José Dilermando Andrade Filho (FIOCRUZ / MG), em colaboração com a Dra. Eunice Aparecida Bianchi Galati (Faculdade de Saúde Pública - USP), constatou-se que não se tratava apenas de uma espécie nova, mas sim de um gênero novo de flebotomíneos para as Américas, com a peculiaridade de ser mais próxima morfologicamente dos flebotomíneos da Europa e África.

Após a descrição, o artigo foi publicado na Revista Brasileira de Entomologia (Volume 47, nº1, págs 63-70), passando, a partir desta data, para todo especialista em Flebotomíneos do Novo Mundo, em seus trabalhos e publicações, fazer menção à este gênero, quando se tratar de classificação.